

FROBEN TOSSE SECCA*1 flacone 125 ml 1,7 mg/5 ml sciroppo

Marchio: FROBEN
Codice Min.: 035117023
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONEFROBEN TOSSE SECCA**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**Sedativo della tosse.**PRINCIPI ATTIVI**Butamirato citrato.**ECCIPIENTI**Gocce orali, soluzione: acido citrico, glicerolo; sorbitolo al 70%; anetolo; vanillina; metile p-idrossibenzoato; acqua depurata. Sciroppo:acido citrico; glicerolo; sorbitolo al 70%; vanillina; metile p-idrossibenzoato; acqua depurata.**INDICAZIONI**Sedativo della tosse.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati; bambini di eta' inferiore ai 6 anni; il prodotto contiene sorbitolo.**POSOLOGIA**>>Gocce orali, soluzione. Bambini tra i 6 e i 12 anni: 20 gocce ogni 8-6 ore. Adulti: 40 gocce ogni 6-5 ore. >>Sciroppo. Bambini tra i 6 e i 12 anni: 10 ml ogni 8-6 ore. Adulti: 15 ml ogni 8-6 ore. Lavare ed asciugare il misurino graduato dopo ogni utilizzo e dopo l'uso tra pazienti diversi. Non superare le dosi consigliate. L'uso prolungato di sedativi della tosse non e' giustificato. Il trattamento deve essere limitato al periodo sintomatico. Se la tosse persiste per piu' di 7 giorni, in presenza di febbre, dispnea o dolore toracico, deve essere consultato il medico.**CONSERVAZIONE**Nessuna particolare precauzione.**AVVERTENZE**A causa dell'inibizione del riflesso della tosse da parte del butamirato, l'uso concomitante con espettoranti deve essere evitato, perche' puo' provocare il ristagno di muco nelle vie respiratorie con aumento del rischio di broncospasmo e di infezione delle vie respiratorie. Neisoggetti affetti da grave insufficienza renale e/o epatica, il farmaco va somministrato solo in caso di effettiva necessita', tenuto conto che i tassi plasmatici efficaci di butamirato citrato possono essere piu' elevati e/o duraturi che nei soggetti con funzionalita' epatica e/orenale normale. Il prodotto contiene glicerolo, sorbitolo e paraidrossibenzoato. Puo' causare mal di testa, disturbi gastrici e diarrea. Ipazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, non devono assumere questo medicinale. Puo' causare reazioni allergiche (anche ritardate).**INTERAZIONI**Non sono stati condotti studi specifici sulle interazioni. L'uso concomitante con espettoranti deve essere evitato.**EFFETTI INDESIDERATI**Le reazioni avverse sono elencate di seguito, in base alla classificazione per sistemi organi e frequenza. Le frequenze sono definite come:molto comune ($\geq 1/10$); comune ($\geq 1/100$, $= 1/1.000$, $= 1/10.000$); **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**La sicurezza d'uso durante la gravidanza e l'allattamento non e' stata valutata in studi specifici. L'uso del medicinale deve essere evitatodurante i primi tre mesi di gravidanza. Durante il resto della gravidanza il farmaco deve essere utilizzato solo se e' strettamente necessario. Non e' noto se il principio attivo e/o uno dei suoi metaboliti siano escreti nel latte materno. Per ragioni di sicurezza, come regola generale, prima di assumere il medicinale durante l'allattamento si devono valutare attentamente i rischi e i benefici.