

GERDOFF 20 COMPRESSE

Marchio:

GERDOFF

Codice Min.:

7640158970065

Link:

[clicca qui per acquistare](#)



GERDOFF Descrizione Gerdoff è un dispositivo medico ad azione meccanica che trova indicazione: -nel trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo. Riduce rapidamente i sintomi correlati quali: bruciore gastrico (pirosi), rigurgito acido, dolore epigastrico, tosse irritativa, disfonia. -nel trattamento sintomatico dell'iperacidità (dolore e bruciore di stomaco occasionale). Gerdoff è un'associazione originale e innovativa di condroitin solfato, acido ialuronico e alluminio idrossido. Gerdoff contribuisce all'effetto protettivo nei confronti dell'azione irritante dell'acido cloridrico prodotto dallo stomaco: -la presentazione in compresse da sciogliere inizialmente in bocca, stimola la salivazione, che permette un miglior contatto dei componenti con la parete esofagea e ne

favorisce la protezione e la lubrificazione. -il condroitin-solfato, aderendo alla mucosa gastro-esofagea, la protegge isolandola efficacemente dall'attacco dei succhi gastrici. -l'acido ialuronico, in combinazione con le proprietà adesive del condroitin solfato, protegge il tessuto dell'esofago danneggiato e ne favorisce la reintegrazione. -l'alluminio idrossido svolge la funzione di antiacido, riducendo l'aggressività dei succhi gastrici nei confronti della mucosa danneggiata. Ingredienti Condroitina solfato sale sodico, saccarosio, alluminio idrossido, calcio carbonato; antiagglomeranti: mono e ditrigliceridi degli acidi grassi, biossido di silicio, sodio ialuronato ad alto peso molecolare; aroma; edulcorante: ammonio glicirizzato. Senza glutine, lattosio e derivati. Modalità d'uso Le compresse vanno inizialmente sciolte in bocca e successivamente masticate. La loro assunzione può essere anche seguita dall'ingestione di acqua o latte. Adulti e bambini sopra i 12 anni: 1-2 compresse dopo i pasti principali e prima di coricarsi, o al bisogno in caso di comparsa dei sintomi come dolore e bruciore di stomaco, secondo consiglio medico. Bambini: sopra i 6 anni: si consiglia di utilizzare il prodotto solo dopo aver consultato il proprio Medico curante. 1 compressa, dopo i pasti principali e/o prima di coricarsi, o al bisogno in caso di comparsa dei sintomi come dolore e bruciore di stomaco. In caso di necessità, la compressa può essere divisa a metà, mediante la linea di prefrazione. Avvertenze Il prodotto contiene alluminio, che potrebbe interferire con l'assunzione contemporanea di farmaci, i citrati possono aumentare l'assorbimento di alluminio. È opportuno non assumere farmaci 1 ora prima e 2 ore dopo l'impiego del prodotto e solo dopo aver consultato il proprio medico. Non eccedere la dose consigliata. In caso di reazioni avverse, interrompere il trattamento e consultare il proprio medico. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il proprio medico. Il prodotto contiene saccarosio, di ciò si tenga conto in pazienti diabetici. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Effetti indesiderati: l'uso se prolungato del prodotto, per l'azione astringente dell'alluminio, può causare stitichezza. Controindicazioni: insufficienza renale. Ipofosfatemia.

Ipersensibilità nota verso uno dei componenti. Gravidanza e allattamento: utilizzare il prodotto dopo aver consultato il proprio Medico. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Confezione da 20 compresse da sciogliere in bocca da 1.100 mg.