

GERDOFF GUSTO LATTE 30 COMPRESSE

Marchio: GERDOFF
Codice Min.: 982483543
Link: [clicca qui per acquistare](#)



GERDOFF Descrizione Gerdoff è un dispositivo medico ad azione meccanica che consente di ridurre rapidamente i sintomi correlati al reflusso gastro-esofageo, quali: pirosi, dolore epigastrico, rigurgito acido, tosse irritativa, disfonia. Utile anche nel trattamento sintomatico dell'iperacidità (dolore e bruciore di stomaco occasionale). Gerdoff è un'associazione originale e innovativa di Condroitina Solfato, Acido Ialuronico e Alluminio Idrossido. Contribuisce all'effetto protettivo nei confronti dell'azione irritante dell'acido cloridrico prodotto dallo stomaco. La presentazione in compresse, da sciogliere inizialmente in bocca, stimola la salivazione che permette un miglior contatto dei componenti con la

parete esofagea e ne favorisce la protezione e la lubrificazione. Il Condroitina Solfato, aderendo alla mucosa gastro-esofagea, la protegge isolandola efficacemente dall'attacco dei succhi gastrici. L'Acido Ialuronico, in combinazione con le proprietà adesive del Condroitina Solfato, protegge il tessuto dell'esofago danneggiato e ne favorisce la reintegrazione. L'Alluminio Idrossido svolge la funzione di antiacido, riducendo l'aggressività dei succhi gastrici nei confronti della mucosa danneggiata. Ingredienti Condroitina solfato, sale sodico, saccarosio, alluminio idrossido, calcio carbonato; antiagglomeranti: mono-di-tri-gliceridi degli acidi grassi, biossido di silicio, sodio ialuronato ad alto peso molecolare; aroma; edulcorante: ammonio glicirizzinato. Senza glutine. Senza lattosio e derivati. Modalità d'uso Adulti e bambini sopra i 12 anni: 1-2 compresse dopo i pasti principali e prima di coricarsi, o al bisogno in caso di comparsa dei sintomi come dolore e bruciore di stomaco, secondo consiglio medico. Bambini sopra i 6 anni: si consiglia di utilizzare il prodotto solo dopo aver consultato il proprio medico curante. 1 compressa, dopo i pasti principali e/o prima di coricarsi, o al bisogno in caso di comparsa dei sintomi come dolore e bruciore di stomaco. In caso di necessità, la compressa può essere divisa a metà, mediante la linea di prefrattura. Le compresse vanno inizialmente sciolte in bocca e successivamente masticate. La loro assunzione può essere anche seguita dall'ingestione di acqua o latte. Avvertenze L'uso se prolungato del prodotto, per l'azione astringente dell'alluminio, può causare stitichezza. Utilizzare il prodotto in gravidanza e allattamento dopo aver consultato il proprio medico. Il prodotto contiene alluminio, che potrebbe interferire con l'assunzione contemporanea di farmaci, i citrati possono aumentare l'assorbimento di alluminio. È opportuno non assumere farmaci 1 ora prima e 2 ore dopo l'impiego del prodotto e solo dopo aver consultato il proprio medico. Non eccedere la dose consigliata. In caso di reazioni avverse, interrompere il trattamento e consultare il proprio medico. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il proprio medico. Il prodotto contiene saccarosio, di ciò si tenga conto in pazienti diabetici. Non utilizzare il prodotto dopo la data di

scadenza riportata sulla confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Controindicato in casi di insufficienza renale, ipofosfatemia e ipersensibilità nota verso uno dei componenti. Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Confezione contenente 30 compresse da 1100 mg Peso netto: 33 g