

GINETANTUM*10 bust polv vag 500 mg

Marchio: GINETANTUM
Codice Min.: 023399013
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONEGINETANTUM 500 MG PER SOLUZIONE CUTANEA PER GENITALI ESTERNI**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**Preparati antinfiammatori per somministrazione vaginale.**PRINCIPI ATTIVI**Ogni bustina contiene il principio attivo: benzidamina cloridrato 500mg. Ogni flaconcino contiene il principio attivo: benzidamina cloridrato 500 mg. Eccipienti con effetti noti: profumo di rosa base (Benzil alcol, Benzil benzoato, Benzil cinnamato, Benzil salicilato, Citral, Citronellol, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Limonene Linanool). Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.**ECCIPIENTI**Granulato per soluzione cutanea:

trimetilcetilammonio-p-toluensulfonato, sodio cloruro, povidone. Concentrato per soluzione cutanea: trimetilcetilammonio-p-toluensulfonato, profumo di rosa base, acqua depurata.**INDICAZIONI**Vulvovaginiti di qualsiasi origine e natura a prevalente componente vulvare, caratterizzate da piccole perdite vaginali, prurito, irritazione, bruciore e dolore vulvare. Igiene intima durante il puerperio.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.**POSOLOGIA**Posologia. Impiegare per il lavaggio dei genitali esterni una o due volte al giorno per un massimo di 7 giorni. Modo di somministrazione: sciogliere il contenuto di 1-2 bustine o di 1-2 flaconcini in 1 litro di acqua.**CONSERVAZIONE**Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.**AVVERTENZE**Ginetantum deve essere impiegato localmente per il lavaggio dei genitali esterni. Non va ingerito. L'uso del prodotto, specie se prolungato, potrebbe dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso occorre sospendere il trattamento ed adottare le idonee misure terapeutiche. Invitare la paziente a contattare il medico prima dell'impiego in caso di sanguinamento vaginale e/o di leucorrea.**INTERAZIONI**Non note.**EFFETTI INDESIDERATI**Occasionalmente, specie con l'uso prolungato del prodotto, possono manifestarsi irritazioni cutanee. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Non esistono controindicazioni all'uso topico della benzidamina in gravidanza o durante l'allattamento.