

GLICEROLO (MARCO VITI)*AD 18 supp 2.250 mg

Marchio: MARCO VITI
Codice Min.: 030334054
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE GLICEROLO MARCO VITI
SUPPOSTE CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Lassativi;
 clismi. **PRINCIPI ATTIVI** Glicerolo. **ECCIPIENTI** Sodio stearato;
 sodio carbonato anidro. **INDICAZIONI** Trattamento di breve
 durata della stitichezza
 occasionale. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** Ipersensibi-
 lita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti; dolore
 addominale acuto o di origine sconosciuta; nausea o
 vomito; ostruzione o stenosi intestinale; sanguinamento rettale di
 origine sconosciuta; crisi emorroidale acuta con dolore e
 sanguinamento; grave stato di disidratazione. **POSOLOGIA** La

dose corretta e' quella minima sufficiente a produrre una facile evacuazione. E' consigliabile usare inizialmente le dosi minime previste. Adulti e adolescenti (12-18 anni): 1 supposta per adulti al bisogno, per un massimo di 1 o 2 somministrazioni al giorno. Bambini di 2-11 anni: 1 supposta per bambini al bisogno, per un massimo di 1 o 2 somministrazioni al giorno. Bambini di 1 mese-2 anni: 1 supposta per la prima infanzia al bisogno, per un massimo di 1 o 2 somministrazioni al giorno. Togliere la supposta dal suo contenitore e poi, se necessario, inumidirla per facilitare l'introduzione rettale. Qualora le supposte apparissero rammollite immergere i contenitori, prima di aprirli, in acqua fredda. Nei bambini **CONSERVAZIONE** Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. **AVVERTENZE** I lassativi devono essere usati il meno frequentemente possibile e per non piu' di sette giorni. L'uso per periodi di tempo maggiori richiede la prescrizione del medico dopo adeguata valutazione del singolo caso. Il trattamento della stitichezza cronica o ricorrente richiede sempre l'intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione dei farmaci e la sorveglianza nel corso della terapia. E' inoltre opportuno che i soggetti anziani o in non buone condizioni di salute consultino il medico prima di usare il medicinale. L'abuso di lassativi puo' causare diarrea persistente con conseguente perdita di acqua, sali minerali (specialmente potassio) ed altri fattori nutritivi essenziali. Nei casi piu' gravi di abuso e' possibile l'insorgenza di disidratazione o ipopotassiemia, la quale puo' determinare disfunzioni cardiache o neuromuscolari, specialmente in caso di trattamento contemporaneo di glicosidici, diuretici o corticosteroidi. L'abuso di lassativi, specialmente quelli di contatto (lassativi stimolanti), puo' causare dipendenza (e, quindi, possibile necessita' di aumentare progressivamente il dosaggio), stitichezza cronica e perdita delle normali funzioni intestinali (atonía intestinale). Negli episodi di stitichezza, si consiglia innanzitutto di correggere le abitudini alimentari integrando la dieta quotidiana con un adeguato apporto di fibre ed acqua. Quando si utilizzano lassativi e' opportuno bere al giorno almeno 6-8 bicchieri di acqua, o altri liquidi, in modo da favorire l'ammorbidimento delle

feci.**INTERAZIONI**Non sono stati effettuati studi specifici di interazione.**EFFETTI INDESIDERATI**Patologie gastrointestinali: dolori crampiformi isolati o coliche addominali e diarrea, con perdita di liquidi ed elettroliti, piu' frequenti nei casi di stitichezza grave, nonche' irritazione a livello rettale.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Non sono stati effettuati studi adeguati e ben controllati sull'uso del medicinale in gravidanza o nell'allattamento. Anche se non ci sono evidenti controindicazioni dell'uso del medicinale in gravidanza e durante l'allattamenti, si raccomanda di assumere il medicinale solo in caso di necessita' e sotto controllo medico.