

## GOLAMIXIN\*spray orofaring 10ml

**Marchio:** GOLAMIXIN  
**Codice Min.:** 016703035  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**DENOMINAZIONE** GOLAMIXIN **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Preparati per il cavo faringeo. **PRINCIPI ATTIVI** Tirotricina/cetrimonio bromuro/benzocaina. **ECCIPIENTI** Olio essenziale menta piperita ml 0,25; alcool q.b. a ml 100. **INDICAZIONI** Terapia topica delle stomatiti batteriche sensibili alla tirotricina. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** Soggetti con ipersensibilità nota verso i singoli componenti, specialmente tirotricina; soggetti dei quali è nota la predisposizione spiccata alle allergopatie. **POSOLOGIA** Adulti: 2-3 applicazioni per volta, 3-4 volte al giorno. Bambini: 1-2 applicazioni per volta, 3-4 volte al giorno. **CONSERVAZIONE** Nessuna. **AVVERTENZE** Nella primissima infanzia il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessità. In caso di mancata risposta entro due giorni dall'inizio della somministrazione, interrompere il trattamento per la possibile colonizzazione di ceppi o funghi (soprattutto Candida) resistenti alla tirotricina. L'impiego, specie se prolungato, di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso occorre interrompere la terapia ed istituire una terapia idonea. Analogo comportamento deve osservarsi in caso di sviluppo di microrganismi non sensibili. **INTERAZIONI** In considerazione dei bassi dosaggi somministrati, non si prevedono interazioni gravi con altri farmaci. **EFFETTI INDESIDERATI** Con l'uso della tirotricina sono stati riferiti annerimento della lingua, raramente glossite e reazioni di sensibilizzazione che, peraltro, regrediscono con l'interruzione del trattamento. Più rilevanti possono essere i sintomi da sensibilizzazione degli anestetici, anche di disordini muscolari, convulsioni. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Nelle donne in stato di gravidanza il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessità.