

## HIPP LATTE ANTIREFLUSSO CON METAFOLINA 600 G

**Marchio:** HIPP  
**Codice Min.:** 983275114  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



HiPPAR Descrizione Alimento a fini medici speciali, indicato in caso di rigurgito e/o reflusso gastroesofageo. Episodi di reflusso dopo la poppata sono normali nei lattanti. Alcuni bambini però rigurgitano una quantità importante di latte o rimettono dopo la poppata. La formula speciale HiPP AR aiuta ad evitare queste situazioni. Grazie all'aggiunta di farina di semi di carrube, la formula speciale HiPP AR ha una consistenza più corposa che favorisce la digestione del pasto. In questo modo, il latte non ritorna nel tubo digerente dopo la poppata (reflusso) e il bambino rigurgiterà di meno. Contiene fermenti lattici e Metafolin (L-metilfolato di calcio). La formula a fini medici speciali HiPP AR è indicata per la gestione dietetica della patologia del reflusso gastro- esofageo nei lattanti (0-12 mesi) sotto controllo medico. Può essere utilizzata dalla nascita per l'alimentazione esclusiva del

bambino e dopo i 6 mesi come parte di una dieta mista. Ingredienti Latte scremato, siero di latte, oli vegetali (olio di palma\*, olio di colza, semi di girasole), lattosio; agente addensante: farina di semi di carrube; olio di pesce, cloruro di potassio, colina, olio estratto da Mortierella alpina, carbonato di calcio, cloruro di calcio, citrato di sodio, L-fenilalanina, selenito di sodio, L-tirosina, solfato di zinco, sali di calcio dell'acido ortofosforico, L-leucina, L-triptofano, L-istidina, solfato ferroso; stabilizzante: acido lattico, iodato di potassio, vitamina C (L- ascorbato di sodio, 6-palmitato di L-ascorbile), fermenti lattici (Limosilactobacillus fermentum hereditum\*\*), vitamina E (acetato di DL-alfa-tocoferile), niacina (nicotinamide), acido pantotenico (D-pantotenato, calcio), solfato rameico, vitamina B1 (cloridrato di tiamina), vitamina A (acetato di retinile), carbonato di magnesio, inositolo, vitamina B6 (cloridrato di piridossina), L-metilfolato di calcio (Metafolin), vitamina K (fitomenadione), vitamina D (colecalfiferolo), D-biotina, vitamina B12 (cianocobalamina). \*olio di palma da coltivazione sostenibile certificato da organismi di controllo indipendenti \*\*Limosilactobacillus fermentum CECT5716 Caratteristiche nutrizionali Valori mediper 100 gdi polvereper 100 ml diprodotto ricostituito\* Energia2.129 kJ 509 kcal275 kJ66 kcal Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - di cui acido linoleico (omega 6) - di cui acido alfa-linoleico (omega 3) - di cui acido arachidonico - di cui acido docosaesaenoico27,7 g 11,6 g 12,3 g 3,8 g 3,10 g 0,47 g 102,0 mg 102,0 mg3,6 g 1,5 g 1,6 g 0,5 g 0,40 g 0,06 g 13,2 mg 13,2 mg Carboidrati di cui zuccheri - di cui lattosio di cui inositolo53,8 g 53,8 g 53,2 g 32 mg6,9 g 6,9 g 6,9 g 4,2 mg Fibre3,1 g0,4 g Proteine di cui L-carnitina9,67 g 14,0 mg1,25 g1,8 mg Sale0,39 g0,05 g Sodio160 mg20 mg Potassio589 mg76 mg Cloruro395 mg51 mg Calcio399 mg51 mg Fosforo229 mg30 mg Magnesio35 mg4,5 mg Ferro5,4 mg0,70 mg Zinco4,6 mg0,60 mg Rame0,41 mg0,053 mg Manganese0,039 mg0,0050 mg Fluoruro Selenio30 mcg3,8 mcg Cromo Molibdeno6,2 mcg0,80 mcg Iodio113 mcg15 mcg Vitamina A17 mcg54 mcg Vitamina D12 mcg1,5 mcg Vitamina E5,4 mg0,70 mg Vitamina K40 mcg5,1 mcg Vitamina C69

mg8,9 mg Vitamina B1 (tiamina) 0,39 mg0,050 mg Vitamina B2 (riboflavina) 1,1 mg0,14 mg Niacina2,6 mg0,34 mg Vitamina B60,22 mg0,029 mg Acido folico77,5 mcg10,0 mcg Vitamina B121,1 mcg0,10 mcg Biotina12 mcg1,5 mcg Acido pantotenico2,6 mg0,34 mg Colina194 mg25 mg \*Dosaggio standard: 100 ml di prodotto si ottengono diluendo 12,9 g di Latte Speciale HiPP AR in 90 ml di acqua. Usare esclusivamente il misurino inserito nella confezione che pieno e raso contiene 4,3 g di Latte Speciale HiPP AR. Modalità d'uso Attenersi scrupolosamente alle modalità d'uso. Una preparazione non corretta potrebbe creare rischi per la salute del bambino. Preparare il latte immediatamente prima della poppata e somministrarlo appena pronto. Non riutilizzare mai il latte avanzato. Lavare accuratamente biberon, tettarella e ghiera. Non riscaldare il prodotto nel forno a microonde (pericolo di ustioni). Far bollire l'acqua e lasciarla raffreddare ad una temperatura di circa 40-50 °C. Per non inattivare i fermenti lattici (lattobacilli), non versare acqua troppo calda sul prodotto. Versare nel biberon l'acqua indicata nella tabella di dosaggio. Riempire il misurino in dotazione e livellare la polvere con il livellatore o con la lama di un coltello pulito. Versare nel biberon la quantità di polvere raccomandata. Chiudere il biberon e agitarlo bene. Dopo aver preparato il Latte Speciale HiPP AR, lasciare in posa per 7 minuti. Agitare nuovamente e controllare la temperatura (circa 37 °C). Tabella indicativa di dosaggio La quantità di latte assunta per ogni biberon può variare da bambino a bambino. Le quantità raccomandate e il numero dei biberon al giorno sono valori indicativi. Il bambino non deve necessariamente finire il biberon. Utilizzare solo il misurino contenuto nella confezione. Per un misurino di polvere servono 30 ml di acqua.

Età	Numero biberon al giorno	Prodotto ricostituito	Acqua bollita	Misurini
1°-2° settimana	*7-8	70 ml	60 ml	2
3°-4° settimana	5-7	100 ml	90 ml	3
5°-8° settimana	5-6	135 ml	120 ml	4
3°-4° mese	5	170 ml	150 ml	5
5° mese	**4-5	200 ml	180 ml	6
dal 6° mese	4	235 ml	210 ml	7

\*Salvo diversa indicazione del pediatra \*\*A partire dal 5° mese, dopo aver sentito il parere del pediatra, si possono iniziare ad introdurre omogeneizzati e pappe. I bambini necessitano approssimativamente di 5 pasti al giorno. Ogni nuovo pasto solido introdotto (omogeneizzati/pappe) sostituisce un biberon di latte. Avvertenze La formula non è adatta ai bambini a rischio di allergie, per i quali si prega di consultare il pediatra. Non utilizzare la formula a fini medici speciali HiPP AR in caso di allergia alle proteine del latte vaccino nota o sospetta. La formula dovrebbe dare sollievo al bambino dopo alcuni giorni di utilizzo. Se non si nota alcun miglioramento dei sintomi del reflusso, si prega di contattare nuovamente il pediatra. I lattini formulati per neonati contengono carboidrati, che sono una parte importante della nutrizione del bambino. Il contatto frequente o prolungato tra i denti e le gengive del bambino e i liquidi contenenti carboidrati potrebbe provocare carie e relativi effetti nocivi sulla salute. Per questo motivo, non dare al bambino il biberon come fosse un succhietto e incoraggiarlo a bere dal bicchiere con il beccuccio il prima possibile. Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale. L'allattamento al seno è la migliore scelta per il bambino. Consultare il pediatra prima di dare al bambino un latte formulato a fini medici speciali. I lattini formulati a fini medici speciali devono essere utilizzati solo sotto controllo medico. Conservazione Conservare da 4 °C a 30 °C. Una volta aperto il sacchetto, richiuderlo bene dopo ogni utilizzo, conservarlo in luogo asciutto e a temperatura ambiente. Validità a confezionamento integro: 9 mesi. Validità post-apertura: 3 settimane. Formato Confezione da 600 g