

HIRUDOID*crema derm 50 g 40.000 Unità Internazionali

Marchio: HIRUDOID
Codice Min.: 010386062
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONEHIRUDOID 40000 U.I.**CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICA**Terapia** antivaricosa; eparinoidi organici.**PRINCIPI ATTIVI**Glicosaminoglicanopolisolfato (P.M. 5700-13700) 445 mg pari a 40000 U.I.**ECCIPIENTI**Crema: cutina LE; trigliceridi a catena media; alcool miristico; isopropile miristato; bentonite; essenza profumata; alcool isopropilico; imidurea; fenossietanolo; olio di rosmarino. Gel: isopropanolo; glicolepropilenico; acido poliacrilico; sodio idrossido; acqua depurata.**INDICAZIONI**Tromboflebiti e flebiti superficiali; edema da stasi venosa; dolore, infiammazione, edema, disturbi trofici negli stati post-flebitici e varicosi;

ematomi.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilità al principio attivo, ad un eparinoide o ad uno qualsiasi degli eccipienti.**POSOLOGIA**Perforare la membrana del tubetto con la spina della capsula. Crema: salvo diversa prescrizione, disporre sulla parte malata 2-3 volte al giorno, 3-5 cm di crema (in caso di necessità e nelle applicazioni iniziali anche di più) e massaggiare leggermente fino all'assorbimento della crema. Nel caso di infiammazioni particolarmente dolenti ed in presenza di trombosi, spalmare con cautela la crema su tutta l'area cutanea interessata ed anche intorno ad essa, e coprire con garza di cotone simili. In questi casi l'effetto terapeutico può essere amplificato frizionando anche zone più lontane dalla parte. Gel: salvo diversa prescrizione, 3-5 cm di gel 2-3 volte al giorno. Il gel è adatto all'impiego nelle tecniche fisioterapeutiche quali ionoforesi e fonoforesi. Nel caso sia utilizzato con tecnica ionoforetica, esso va applicato sul catodo.**CONSERVAZIONE**Gel: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Crema: conservare a temperatura inferiore a 25 gradi C.**AVVERTENZE**Uso esterno; se compaiono fenomeni di sensibilizzazione, che possono originarsi con l'uso protratto dei prodotti per applicazione cutanea, occorre interrompere il trattamento. Le formulazioni gel e crema contengono un alcool tra gli eccipienti e pertanto non devono essere applicati su ferite aperte o mucose. Il gel contiene glicole propilenico che può causare irritazione cutanea.**INTERAZIONI**Non sono segnalate particolari interazioni con altri medicinali.**EFFETTI INDESIDERATI**Non sono segnalati particolari effetti indesiderati. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Non sono previste particolari precauzioni o avvertenze in caso di gravidanza e di allattamento.