HUMANA 2 PROBALANCE 1100 G MP

Marchio:	HUMANA
Codice Min.:	944182676
Link:	clicca qui per acquistare

Humana 2 PROBALANCE Latte di proseguimento dal 6° mese compiuto al 12° Descrizione Il bambino sta crescendo e i suoi bisogni nutrizionali cambiano. Humana 2 è indicato nell'alimentazione del lattante dal 6° mese di vita fino all'anno di età. All'interno di una dieta varia e bilanciata, Humana 2 ProBalance accompagna il piccolo nelle scoperte di ogni giorno, fornendogli i nutrienti di cui ha bisogno nelle giuste quantità in base all'età: - HMO: oligosaccaridi del latte umano, uno dei principali componenti del latte materno, insieme al grasso e al lattosio. Per il latte di proseguimento viene utilizzato l'HMO "2'FL". - DHA: acido docosaesaenoico, che contribuisce al normale sviluppo visivo dei bambini fino a 12 mesi (si ottiene un effetto benefico con un'assunzione giornaliera di 100 mg di DHA). - ARA: acido arachidonico, un importante acido grasso omega-6. - GOS: galatto-oligosaccaridi, fibre. - ALA: acido alfa-linoleico, un acido grasso essenziale che contribuisce allo sviluppo cerebrale e del tessuto nervoso. - Vitamina C: contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario. Ingredienti Siero del latte demineralizzato in polvere, lattosio, olio di palma, latte scremato in polvere, olio di colza, olio di girasole, galatto-oligosaccaridi (da latte), olio di palmista, 2'-fucosillattosio (da latte), olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp., olio di Mortierella alpina, bisglicinato ferroso, cloruro di potassio, carbonato di calcio, bitartrato di colina, sali di calcio dell'acido ortofosforico, citrato di sodio, inositolo, selenato di sodio, L-triptofano, carbonato di magnesio, L-tirosina, solfato di manganese, L-ascorbato di sodio, citrato di potassio, L- fenilalanina, nucleotidi (acido citidin-5'-monofosforico, sali sodici dell'acido uridin-5'-fosforico, acido adenosin- 5'-fosforico, sali sodici dell'acido inosin-5'-fosforico, sali sodici dell'acido guanosin-5'-fosforico), taurina, iodato di potassio, acetato di DL-alfa-tocoferile, solfato di zinco, colecalciferolo, acetato di retinile, D-pantotenato calcio, nicotinamide, solfato rameico, D-biotina, monnonitrato di tiamina, cloridrato di piridossina, fitomenadione, acido folico, riboflavina, cianocobalamina. Caratteristiche nutrizionali Valori nutrizionali mediper 100 g di polvere100 ml al 13,5% Energia2.036 kJ 487 kcal275 kJ 66 kcal Grassi di cui Acidi grassi saturi Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi polinsaturi - Acido linoleico (LA) - Acido alfa-linoleico (ALA) - Acido arachidonico (ARA) - Acido docosaesaenoico (DHA)24,7 g 9,1 g 10,1 g 5,5 g 4.612 mg 429 mg 55 mg 110 mg3,3 g 1,2 g 1,4 g 0,7 g 623 mg 57,9 mg 7,4 mg 14,9 mg Carboidrati di cui Zuccheri - Lattosio Inositolo54,8 g 53,9 g 53 g 0,11 g7,4 g 7,3 g 7,2 g 0,01 g Fibre di cui 2'-fucosillattosio (2'FL) Galatto-oligosaccaridi3,4 g 0,3 g 3,1 g0,46 g 0,04 g 0,42 g Proteine9,4 g1,3 g Vitamina A450 mcg60,8 mcg Vitamina D11 mcg1,5 mcg Vitamina E13 mg1,8 mg Vitamina K63 mcg8,5 mcg Vitamina C83 mg11,2 mg(24%*) Tiamina (vit. B1)0,83 mg0,11 mg Riboflavina (vit. B2)1,1 mg0,15 mg Niacina4,7 mg0,63 mg Vitamina B60,48 mg0,06 mg Acido folico92 mcg12,4 mcg Vitamina B121,4 mcg0,19 mcg Biotina20,8 mcg2,8 mcg Acido pantotenico5,8 mg0,78 mg Sodio208 mg28,1 mg Potassio650 mg87,8 mg Cloruro449 mg60,6 mg

Calcio465 mg62,8 mg Fosforo281 mg37,9 mg Magnesio49 mg6,6 mg Ferro4,6 mg0,62 mg Zinco3,7 mg0,50 mg Rame0,39 mg0,05 mg Manganese0,25 mg0,03 mg Fluoro0,03 mg0 mg Selenio28 mcg3,8 mcg Iodio107 mcg14,4 mcg Citidina-5'-monofosfato6,9 mg0,93 mg Uridina-5'-monofosfato4,7 mg0,63 mg Adenosina-5'-monofosfato4,3 mg0,58 mg Inosina-5'-monofosfato2,7 mg0,36 mg Guanosina-5'-monofosfato1,3 mg0,18 mg Colina184 mg24,8 mg Carnitina13,3 mg1,8 mg Taurina29,4 mg4 mg *% dell'assunzione all'assunzione di riferimento secondo il Regolamento Delegato (UE) N. 2016/127. Modalità d'uso Nella preparazione del latte osservare scrupolosamente le indicazioni per l'uso. Sterilizzare il biberon, tettarella e ghiera prima di ogni utilizzo. Preparare il latte prima di ogni pasto e somministrare subito. Preparazione e modalità d'uso inappropriate possono nuocere alla salute del lattante. Bollire l'acqua, lasciarla raffreddare fino a 50°C (oppure riscaldare a 50°C l'acqua Humana Amorosa) e versarla nel biberon. Aggiungere il numero di misurini necessari, livellando la polvere con l'apposito livellatore. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione. Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere. Raffreddare sotto acqua corrente fino a circa 37°C e verificarne la temperatura. Le quantità di latte riportate sono indicative; il dosaggio può variare previa indicazione del pediatra, in relazione alle esigenze del lattante. La ricostituzione del latte Humana 2 si ottiene aggiungendo un misurino raso e non pressato di polvere (circa 4,5 g) ogni 30 ml di acqua, meglio se minimamente mineralizzata come Humana Amorosa. EtàAcquaNr. misurinirasiEquivalentedi latteNr. pastinelle 24 ore Da 6 mesi180 ml6200 ml4-3 7-12 mesi180 ml6200 ml3-2 Avvertenze Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante. Qualore l'allattamento al seno non sia sufficiente o possibile, previo parere del pediatra, si può ricorrere ad un latte formulato. Per una corretta igiene dentale, non utilizzare il biberon di latte come succhiotto. Non riutilizzare il latte avanzato. Non scaldare nel microonde: rischio di scottature. Humana 2 è indicato nell'alimentazione del lattante dal 6° mese di vita fino all'anno di età, come complemento e integrazione di una dieta varia e bilanciata e non deve essere utilizzato come sostituto del latte materno nei primi sei mesi di vita. L'inizio dello svezzamento deve avvenire unicamente seguendo le indicazioni del pediatra. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. Validità post-apertura: 3 settimane. Formato Confezione da 1100 g. Cod. 72012