

ICTAMMOLO (NEW.FA.DEM.)*ung derm 30 g 10%

Marchio: NEW.FA.DEM. SRL
Codice Min.: 031066018
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE ICTAMMOLO NEW.FA.DEM. 10% UNGUENTO **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Preparati antiacne per uso topico. **PRINCIPI ATTIVI** Ammonio solfo ittiolato. **ECCIPIENTI** Vaselina bianca. **INDICAZIONI** Infiammazioni e piccole infezioni cutanee; foruncolosi (brufoli), ascessi, e ulcerazioni superficiali della cute; infiammazione delle ghiandole sudoripare (idrosadeniti). **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** Ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **POSOLOGIA** Applicare l'unguento, nella quantita' necessaria in relazione alla parte da trattare, 2 - 3 volte al giorno, coprendo con una garza. **CONSERVAZIONE** Conservare ad una temperatura non superiore ai 30 gradi C; conservare il contenitore ben chiuso nella confezione originale. **AVVERTENZE** Non applicare in prossimita' degli occhi e sulle mucose. Evitare di esporsi al sole e raggi UVA dopo l'applicazione. L'uso, specie se prolungato, dei medicinali per uso locale puo' dare origine a fenomeni di irritazione o di sensibilizzazione. Ove cio' si verifici, interrompere il trattamento. **INTERAZIONI** Non sono stati effettuati studi specifici di interazione. **EFFETTI INDESIDERATI** Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di ictammolo, organizzati secondo la classificazione organo sistemica MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. **Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo:** dermatiti, bruciori, irritazioni della cute, reazioni di ipersensibilita'. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** In mancanza di studi specifici, il medicinale deve essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento solo in caso di necessita'.