

## IFENEC\*polv cutanea 30 g 1%

**Marchio:** ITALFARMACO SPA  
**Codice Min.:** 024066045  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**DENOMINAZIONE** IFENECC **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Antimicotici per uso topico. **PRINCIPI ATTIVI** Econazolo nitrato. **ECCIPIENTI** Crema: poliossietilenglicol palmito stearato; gliceridi poliossietilenati di acidi grassi saturi; paraffina liquida; acido benzoico; butilidrossianisolo; acqua depurata. Emulsione cutanea: poliossietilenglicol palmito stearato; gliceridi poliossietilenati di acidi grassi saturi; paraffina liquida; silice precipitata; acido benzoico; butilidrossianisolo; acqua depurata. Polvere cutanea: zinco ossido; silice precipitata; talco. Soluzione cutanea: polisorbato 20; alcool benzilico; sorbitanmonolaurato; acqua-sodio trideciletere solfato-sodio lauroanfoacetato, sale sodico, polietilen glicole 6000 distearato; acqua depurata. **INDICAZIONI** Crema, polvere cutanea, emulsione cutanea: infezioni micotiche della cute e dei suoi annessi, anche se complicate da sovrainfezioni da germi gram-positivi. Soluzione cutanea: pityriasis versicolor. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' individuale gia' accertata verso i componenti. **POSOLOGIA** Crema, emulsione cutanea, polvere cutanea: stendere sulla lesione, due volte al giorno, la crema (sul capillizio e sulle zone pilifere usare il farmaco emulsione). Nel trattamento delle onicomicosi ricoprire con medicazione occlusiva. Usare la polvere cutanea nelle infezioni umide, nelle micosi interdigitali e per la disinfezione quotidiana delle calze e dell'interno delle scarpe. Soluzione cutanea: il prodotto deve essere utilizzato, per almeno tre sere consecutive, come soluzione da bagno cospargendo tutto il corpo, preventivamente bagnato, con una spugna su cui sia stato versato il contenuto di una bustina di medicinale. Frizionare per alcuni minuti (3-5) indi lasciare asciugare la soluzione senza risciacquare: e' consentita una doccia con sola acqua il mattino seguente; in tal modo il medicamento ha la possibilita' di svolgere la sua azione sull'intera superficie corporea per tutta la notte. Se a distanza di 15 giorni dal termine della terapia la Pityriasis versicolor non fosse ancora debellata, e' opportuno ripetere un secondo ciclo di trattamento. In ogni caso, al fine di evitare ricadute o reinfezioni, si raccomanda di ripetere il trattamento a distanza di 1-3 mesi. **CONSERVAZIONE** Nessuna. **AVVERTENZE** Tutte le forme farmaceutiche del prodotto sono indicate solo per uso esterno. **INTERAZIONI** Nessuna nota. **EFFETTI INDESIDERATI** Il farmaco e' in genere ben tollerato anche dalle pelli sensibili. Solo in rarissimi casi sono possibili irritazioni locali in zone eczematose: in tali situazioni far precedere, per alcuni giorni, la terapia con il medicinale da un trattamento antieczematoso. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Nelle donne in stato di gravidanza e nella primissima infanzia il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessita'. I preparati per uso topico, specie se usati per trattamenti prolungati, possono dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove cio' accada e' necessario interrompere il trattamento ed istituire una terapia idonea.