

INFLORAN*20 cps 0,25 g

Marchio: INFLORAN
Codice Min.: 024037018
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE INFLORAN CAPSULE RIGIDE **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Organismi produttori di acido lattico, combinazioni. **PRINCIPI ATTIVI** Una capsula contiene: Bifidobacterium bifidum vivo liofilizzato non meno di 1.000 milioni - Lactobacillus acidophilus vivo liofilizzato non meno di 1.000 milioni. **ECCIPIENTI** Saccarosio, sodio citrato, magnesio stearato, potassio fosfato dibasico, lattosio monoidrato. **INDICAZIONI** Profilassi. Prevenzione delle sindromi dismicrobiche gastrointestinali. Terapia. Sindromi diarroiche e dispeptiche da alterata flora batterica (diarrea, enteriti aspecifiche degli adulti e dei lattanti, coliti). Dismicrobismi da

antibiotici. Disturbi digestivi nel lattante nutrito artificialmente. Coadiuvante nella eliminazione degli enterobatteri patogeni resistenti ai chemioantibiotici. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **POSOLOGIA** Una capsula tre volte al giorno. Modo di somministrazione: deglutire con un po' di liquido non caldo sia nel bambino che nell'adulto, prima dei pasti. Popolazione pediatrica: nei lattanti versare il contenuto della capsula in un po' di liquido o acqua zuccherata, non caldi. Non superare le dosi consigliate. **CONSERVAZIONE** Conservare in frigorifero (2 gradi C - 8 gradi C). Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. **AVVERTENZE** Non usare per trattamenti protratti. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. Si possono osservare differenze di colore del liofilizzato tra un lotto e l'altro, dovute agli eccipienti del preparato. Il medicinale contiene lattosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lattasi, o da malassorbimento di glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale. Il medicinale contiene saccarosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, da malassorbimento di glucosio-galattosio, o da insufficienza di sucralasi isomaltasi, non devono assumere questo medicinale. **INTERAZIONI** Non segnalate. **EFFETTI INDESIDERATI** Alle dosi consigliate non sono segnalati effetti indesiderati. Segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Può essere somministrato durante la gravidanza e l'allattamento.