

IRIDINA DUE*10 monod collirio 0,5 ml 0,05%

Marchio: IRIDINA
Codice Min.: 026630032
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE IRIDINA DUE **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Oftalmici, decongestionanti. **PRINCIPI ATTIVI** 1 ml di collirio, soluzione contiene: nafazolina cloridrato 0,5 mg. **ECCIPIENTI** Sodio cloruro, sodio diidrogeno fosfato diidrato, sodio idrossido, sodio ialuronato, acqua distillata di Hamamelis, acqua distillata di Camomilla, acqua per preparazioni iniettabili. **INDICAZIONI** Irritazione, bruciori, arrossamento dell'occhio, con eccessiva lacrimazione, e sensibilita' alla luce. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** Ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Il prodotto non deve essere usato in pazienti affetti da glaucoma o con altre malattie dell'occhio. Controindicato nei bambini al di sotto dei dieci anni. **POSOLOGIA** Quando si avverte la sensazione di bruciore, spremere una o due gocce di collirio nell'angolo interno di ciascun occhio, inclinando all'indietro la testa. Attenersi scrupolosamente alle dosi consigliate. Un dosaggio superiore del prodotto, anche se assunto per via topica e per breve periodo di tempo, puo' dar luogo ad effetti sistemici gravi. **CONSERVAZIONE** Conservare a temperatura non superiore a 30 gradi C. Il prodotto non contiene conservanti: il contenitore monodose, una volta aperto, deve essere gettato dopo l'uso, anche se utilizzato solo in parte. **AVVERTENZE** In caso del persistere o aggravarsi dei sintomi dopo breve periodo di trattamento, consultare il medico, in ogni caso, il prodotto non deve essere impiegato per piu' di 4 giorni consecutivi. Se si ha la comparsa di effetti indesiderati in un periodo minore di 4 giorni si interrompe la terapia e si consulta il medico. Infezioni, pus, corpi estranei nell'occhio, danni meccanici, chimici, da calore richiedono l'attenzione del medico. Il prodotto pur presentando uno scarso assorbimento sistemico, deve essere usato con cautela nei pazienti affetti da ipertensione, ipertiroidismo, disturbi cardiaci e iperglicemia (Diabete). **INTERAZIONI** Il prodotto deve essere usato con cautela in caso di trattamento con farmaci antidepressivi. **EFFETTI INDESIDERATI** L'uso del prodotto puo' causare talvolta dilatazione pupillare, effetti sistemici da assorbimento (ipertensione, disturbi cardiaci, iperglicemia), aumento della pressione endoculare, nausea, cefalea. Raramente possono manifestarsi fenomeni di ipersensibilita'. In tal caso occorre interrompere il trattamento e consultare il medico affinche', ove necessario, possa essere istituita una terapia idonea. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Non risultano limitazioni d'uso durante la gravidanza e l'allattamento.