

## IRIDINA DUE\*collirio 10 ml 0,5 mg/ml

**Marchio:** IRIDINA  
**Codice Min.:** 026630020  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE IRIDINA DUE 0,5 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Oftalmici diversi. PRINCIPI ATTIVI Nafazolina cloridrato 5 mg. ECCIPIENTI Sodio cloruro, sodio diidrogeno fosfato diidrato, sodio idrossido, sodio ialuronato, benzalconio cloruro, acqua distillata di Hamamelis, acqua distillata di camomilla, acqua depurata. INDICAZIONI Irritazione, bruciori, arrossamento dell'occhio, con eccessiva lacrimazione, e sensibilità alla luce. CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico; in particolare verso xilometazolina, oximetazolina, tetrizolina. Il prodotto non deve essere usato in pazienti affetti da glaucoma o con altre

malattie dell'occhio. Controindicato nei bambini al di sotto dei dodici anni. Contemporaneo trattamento con farmaci inibitori delle monoaminossidasi. POSOLOGIA Quando si avverte la sensazione di bruciore, spremere una o due gocce di collirio nell'angolo interno di ciascun occhio, inclinando all'indietro la testa. Il prodotto non deve essere usato dopo 28 giorni dalla prima apertura. Attenersi scrupolosamente alle dosi consigliate. Un dosaggio superiore del prodotto, anche se assunto per via topica e per breve periodo di tempo, può dar luogo ad effetti sistemici gravi. CONSERVAZIONE Questo medicinale non richiede alcuna speciale condizione di conservazione. Il periodo di validità dopo prima apertura del flacone è di 28 giorni. AVVERTENZE Il prodotto non deve essere impiegato per più di 4 giorni consecutivi. Se si ha la comparsa di effetti indesiderati in un periodo minore di 4 giorni si interrompe la terapia. Il prodotto non risulta idoneo al trattamento di infezioni, pus, corpi estranei nell'occhio, danni meccanici, chimici e da calore. Tali condizioni richiedono attenzione. Il prodotto pur presentando uno scarso assorbimento sierico, deve essere usato con cautela nei pazienti affetti da ipertensione, ipertiroidismo, disturbi cardiaci, iperglicemia (Diabete) e asma bronchiale. Contiene Benzalconio Cloruro; durante il trattamento non devono essere indossate lenti a contatto morbide. In caso di uso di lenti a contatto, queste devono essere rimosse prima dell'instillazione del collirio e possono essere riapplicate dopo 15 minuti. L'ingestione accidentale può causare depressione del S.N.C. (sedazione spiccata ipotonia, coma). In questi casi è sempre necessaria un'immediata assistenza. INTERAZIONI Il collirio non deve essere usato dai soggetti in trattamento con farmaci antidepressivi (IMAO) e nelle due settimane successive a tale trattamento poiché possono comparire severe crisi ipertensive. EFFETTI INDESIDERATI L'uso del prodotto può causare talvolta dilatazione pupillare, effetti sistemici da assorbimento, aumento della pressione endoculare, nausea, cefalea. Raramente possono manifestarsi fenomeni di ipersensibilità. In tal caso occorre interrompere il trattamento e, ove necessario, istituire una terapia idonea. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO In

gravidanza e durante l'allattamento usare solo in caso di effettiva necessita'.