

IRIDINA LIGHT*collirio 10 ml 0,01%

Marchio: IRIDINA
Codice Min.: 032193029
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONEIRIDINA LIGHT 0,1 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE**CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICAAntimicrobici.**PRINCIPI ATTIVI**10 ml di collirio, soluzione contengono:
benzalconio cloruro 1 mg.**ECCIPIENTI**Disodio edetato, sodio cloruro, sodio ialuronato, acqua distillata
diHamamelis, acqua distillata di Camomilla, acqua depurata.**INDICAZIONI**Disinfezione della mucosa
oculare. E' coadiuvante nel trattamento degli occhi irritati da polvere e
fumo.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' verso i componenti. Non usare in bambini
al di sottodei 12 anni, se non dopo aver consultato il medico.**POSOLOGIA**Una o due gocce in ciascun
occhio fino a cinque o sei volte al giorno.**CONSERVAZIONE**Questo medicinale non richiede alcuna
particolare condizione per la conservazione.**AVVERTENZE**Non usare in trattamenti prolungati, se dopo
breve periodo di tempo non si presentano risultati apprezzabili consultare il medico. L'uso, specie
prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso
interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una terapia idonea. L'ingestione o
l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti puo' avere conseguenzegravi, talvolta fatali. In caso di
ingestione accidentale del prodotto, consultare immediatamente un medico. Il prodotto e' solo per uso
esterno. E' da evitare l'applicazione in caso di infiammazioni, ferite oabrasioni corneali. Portatori di lenti
a contatto: attendere 15 minutitra l'instillazione del collirio e l'applicazione di lenti a contatto. Non usare
mentre si indossano lenti a contatto.**INTERAZIONI**Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e
detergenti.**EFFETTI INDESIDERATI**E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o
irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifiche del trattamento. Comunicare al
proprio medico o al proprio farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti.**GRAVIDANZA E**
ALLATTAMENTONon risultano limitazioni d'uso durante la gravidanza e l'allattamento.