

## IRILENS GOCCE OCULARI 15 AMPOLLE MONODOSE RICHIUDIBILI 0,5 ML

**Marchio:** IRIDINA  
**Codice Min.:** 904309440  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



irilens GOCCE OCULARI Soluzione oftalmica sterile, priva di conservanti, ad effetto idratante e lubrificante, contenente acido ialuronico sale sodico allo 0,4% di origine biotecnologica ad alto peso molecolare. L'acido ialuronico sale sodico è un mucopolisaccaride che, in caso di alterazioni del film lacrimale ne ristabilisce l'equilibrio. La sua concentrazione, allo 0,4% consente una maggiore idratazione con un'azione prolungata nel tempo. È quindi indicato in tutti i casi in cui si presentino disturbi causati da secchezza oculare. Può essere utilizzato anche da chi porta lenti a contatto. Modalità di utilizzo Con le mani pulite aprire la busta di protezione, staccare un monodose e aprirlo ruotando ed estraendo il cappuccio. Instillare 1/2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il

monodose. Il contenitore, dopo la prima apertura, può essere richiuso con l'apposito cappuccio e la soluzione rimasta all'interno del monodose potrà essere riutilizzata entro 12 ore. I portatori di lenti a contatto possono applicare 1-2 gocce di soluzione su ogni lente prima dell'inserimento, per mantenere l'occhio umido e lubrificato. Ripetere, se necessario, l'operazione 2-4 volte al giorno. Il prodotto è monopaziente. Componenti Acido ialuronico sale sodico 0,4%, sodio fosfato monobasico monoidratato, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Conservazione Conservare i monodose non utilizzati nella busta di protezione. Conservare a temperatura non superiore a 30 °C. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Avvertenze Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno. Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso. Lasciar trascorrere almeno 15 minuti dopo l'uso prima di instillare farmaci per uso oftalmico esterno. Durante l'applicazione, non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore. Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione. Tenere il preparato fuori dalla portata dei bambini. In caso di disturbi durante l'uso, sospendere il trattamento e consultare un medico. In alcuni casi, dopo la somministrazione, si è osservato un breve offuscamento della vista dovuto alla densità della soluzione, che comunque scompare molto rapidamente. Formato 15 monodose sterile da 0,5 ml richiudibili.