

## **KALOPA\*orale gtt 100 ml 20 mg/7,5 ml**

**Marchio:** SCHWABE PHARMA  
ITALIA

**Codice Min.:** 038135075

**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**DENOMINAZIONE**KALOPA **SCIROPPO****CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**Preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento.**PRINCIPI ATTIVI**100 g (= 93,985 ml) di sciroppo contengono principio attivo: 0,251 g di estratto (come estratto liquido essiccato) di Pelargonium sidoide sDC, radix (Pelargonio radice) (1:8-10) (EPs 7630). Solvente di estrazione: etanolo 12% (v/v). Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1.**ECCIPIENTI**Maltodestrina, xilitolo, glicerolo 85%, acido citrico anidro, potassiosorbato, gomma xanthan, acqua depurata.**INDICAZIONI**Medicinale tradizionale di origine vegetale indicato per il trattamento sintomatico del raffreddore comune negli adulti e bambini di eta' superiore ai 6 anni. L'impiego di questo medicinale tradizionale di origine vegetale, per le indicazioni terapeutiche indicate, si basa esclusivamente sull'esperienza di utilizzo pluriennale.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1; tendenza al sanguinamento; assunzione di farmaci che inibiscono la coagulazione; insufficienza renale grave; insufficienza epatica grave.**POSOLOGIA**Posologia. Adulti e adolescenti di eta' superiore ai 12 anni: la dose raccomandata e' 7,5 ml di sciroppo (corrispondenti a 20 mg di estratto di pelargonio) 3 volte al giorno. Bambini di eta' tra i 6 e 12 anni: la dose raccomandata e' 5 ml di sciroppo (corrispondenti a circa 13 mg di estratto di pelargonio) 3 volte al giorno. Durata del trattamento: la durata massima del trattamento e' di 7 giorni. Popolazioni speciali: non sono disponibili informazioni su pazienti con compromissione epatica e renale. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di KALOPA nei bambini di eta' inferiore ai 6 anni non sono state ancora stabilite. Modo di somministrazione: il bicchiere dosatore annesso alla confezione presenta diversi segni di taratura. Lo sciroppo puo' essere bevuto direttamente dal dosatore o trasferito su un cucchiaino.**CONSERVAZIONE**Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Nota: poiche' KALOPA e' un prodotto naturale, possono verificarsi lievi variazioni nel colore e nel gusto.**AVVERTENZE**Sono stati riportati casi di epatotossicita' ed epatiti in associazione alla somministrazione del medicinale. In presenza di segni di epatotossicita' la somministrazione del medicinale deve essere interrotta immediatamente ed e' necessaria una rivalutazione del caso. Il trattamento deve essere interrotto anche in caso di tachipnea o di emottisi.**INTERAZIONI**Non sono stati effettuati studi d'interazione. A causa della possibile influenza sui parametri della coagulazione, non puo' essere escluso che KALOPA aumenti gli effetti di farmaci anticoagulanti assunti in concomitanza come il fenprocumone e il warfarin.**EFFETTI INDESIDERATI**La valutazione delle reazioni avverse si basa sulle seguenti informazioni relative alla frequenza: molto comune: (> 1/10); comune: (>=1/100, 1/1.000, =1/10.000, **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**La sicurezza durante la gravidanza e l'allattamento con latte materno non e' stata stabilita. La somministrazione di KALOPA durante la gravidanza e l'allattamento con latte materno non e' raccomandata e deve essere presa in considerazione solo se il beneficio atteso per la madre supera il rischio per il feto o il bambino.