

## KETONOVA\*shampoo 120 ml 20 mg/g

**Marchio:** PIERRE FABRE ITALIA  
SPA

**Codice Min.:** 037466024

**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**DENOMINAZIONE**KETONOVA 20 MG/G SHAMPOO **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**Derivati imidazolici e triazolici.**PRINCIPI ATTIVI**Ketoconazolo 2% in peso (20 mg/g).**ECCIPIENTI**Sodio lauril etere solfato, monolauril etere succinato bisodico, macrogol-120 metilglucosio dioleato, macrogol-7-gliceril coccoato, imidurea, idrossipropil laurildimonio collagene animale idrolizzato, fenossietanolo, potassio sorbato, dietanolamide di acidi grassi di cocco, sodioidrossido, sodio cloruro, Ponceau 4R (E124), acido cloridrico concentrato, acqua depurata.**INDICAZIONI**Trattamento della dermatite seborroica del cuoio capelluto.**CONTROINDICAZIONI/EFF.SECONDARI**ipersensibilita' al ketoconazolo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.**POSODOLOGIA**Per applicazione topica. Lavare con lo shampoo le zone affette e risciacquare dopo averlo lasciato agire per 3-5 minuti. Pazienti di eta' superiore a 15 anni: dermatite seborroica. Trattamento: due volte a settimana per 2-4 settimane. Profilassi: una volta a settimana oppure ogni2 settimane.**CONSERVAZIONE**Non conservare a temperatura superiore a 25 gradi C.**AVVERTENZE**La dermatite seborroica e la forfora sono spesso associate a caduta dicapelli e cio' e' stato riportato, sebbene raramente, anche con l'usodel medicinale 20 mg/g shampoo. Nei pazienti che sono stati in trattamento prolungato con corticosteroidi per uso topico, si raccomanda chela terapia steroidea venga gradualmente sospesa nel corso di un periodo di 2-3 settimane, mentre si usa il medicinale 20 mg/g shampoo, perprevenire un potenziale effetto rebound. Evitare il contatto con gli occhi. Se lo shampoo venisse a contatto con gli occhi, questi devono essere sciacquati con acqua. Lo shampoo non deve essere utilizzato in bambini o in adolescenti di eta' inferiore ai 15 anni.**INTERAZIONI**L'assorbimento sistemico di ketoconazolo applicato per via topica e' minimo ed e' improbabile, l'interazione sistemica con altri prodotti medicinali.**EFFETTI INDESIDERATI**Frequenze reazioni avverse: molto comune ( $\geq 1/10$ ), comune ( $\geq 1/100$ , =  $1/1.000$ , =  $1/10.000$  a **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Non vi sono studi adeguati e ben controllati su donne in gravidanza oin allattamento. Non e' stato possibile rilevare concentrazioni plasmatiche di ketoconazolo dopo somministrazione topica del farmaco 20 mg/gshampoo sul cuoio capelluto di donne non incinte. Sono stati rilevatilivelli plasmatici dopo somministrazione topica del medicinale 20 mg/g shampoo su tutto il corpo. Non ci sono rischi noti associati all'usodel farmaco 20 mg/g shampoo in gravidanza e allattamento.