

LACTEOL*10 bust polv orale 10 mld

Marchio: LACTEOL
Codice Min.: 028962025
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE LACTEOL. **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Antidiarroici di origine microbica. **PRINCIPI ATTIVI** Una capsula contiene 170 mg di polvere di Lactobacillus LB* (corpi microbici inattivati e liofilizzati) in brodo di cultura fermentato, corrispondente a 5 miliardi di Lactobacillus LB^*. Una bustina contiene: 340 mg di polvere di Lactobacillus LB^* (corpi microbici inattivati e liofilizzati) in brodo di coltura fermentato, corrispondente a 10 miliardi di Lactobacillus LB^*. ^* Lactobacillus fermentum and Lactobacillus delbrueckii. **ECCIPIENTI** Capsule: brodo di coltura fermentato e liofilizzato, lattosio monoidrato, calcio carbonato, acido silicico,

talco, magnesio stearato, lattosio anidro, gelatina. Bustine: brodo di coltura fermentato e liofilizzato, lattosio monoidrato, calcio carbonato, acido silicico, aroma banana-arancia, saccarosio. **INDICAZIONI** Sindromi diarroiche e dispeptiche da alterata flora batterica (diarrea, enteriti aspecifiche del lattante e degli adulti, coliti). Dismicrobismo intestinale da antibiotici. Disturbi digestivi nel lattante nutrito artificialmente. Coadiuvante nell'eliminazione degli enterobatteri patogeni resistenti ai chemio-antibiotici. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilità individuale verso il farmaco. **POSOLOGIA** Capsule: da 2 a 4 capsule al giorno. In caso di diarree acute: 2 capsule 3 volte al dì il primo giorno, 2 capsule due volte al dì fino al secondo giorno dopo la scomparsa della sintomatologia. Ingerire una capsula bevendo acqua. Il contenuto della capsula può essere sciolto nel biberon con acqua o latte. Bustine: da 1 a 2 bustine al giorno. In caso di diarrea acuta: 1 bustina 3 volte al dì il primo giorno, 2 volte fino al secondo giorno dopo la scomparsa dei sintomi. Stemperare il granulato della bustina in mezzo bicchiere d'acqua. Il contenuto di una bustina può essere disciolto nel biberon con acqua o latte. **CONSERVAZIONE** Lacteol capsule: conservare a temperatura non superiore a 25 gradi C. Lacteol bustine: nessuna speciale precauzione per la conservazione. **AVVERTENZE** Nei lattanti sotto i due anni il prodotto deve essere usato unitamente a terapia reidratante. Sopra ai due anni il trattamento con il prodotto non esclude una terapia di reidratazione, qualora necessaria. Il grado di reidratazione (per via orale o endovenosa) deve adattarsi all'aggravità della diarrea, all'età e alle condizioni di salute del paziente. **INTERAZIONI** Non sono state segnalate interazioni con l'uso di altri farmaci sistemici né topici. **EFFETTI INDESIDERATI** Non sono noti. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Non si conoscono effetti teratogeni. Non è stato registrato sovradosaggio dovuto al passaggio del prodotto nel latte della madre durante l'allattamento.