

LACTOSAL FREE COLLIRIO SOLUZIONE OFTALMICA DA 10 ML

Marchio: LACTOSAL
Codice Min.: 979081647
Link: [clicca qui per acquistare](#)



LACTOSAL free Descrizione Lactosal free è una soluzione oftalmica ipertonica sterile con sodio cloruro e sale sodico dell'acido lattobionico, senza conservanti, utile alla lubrificazione della superficie oculare in presenza di edema oculare. L'acido lattobionico è un poli-idrossiacido complesso costituito da acido gluconico e galattosio. Questa molecola presenta un alto potere idratante ed ha proprietà antiossidanti. Al flacone di Lactosal free è applicato il contagocce OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) che, tramite il suo sistema di filtro assoluto e valvola, garantisce il mantenimento della sterilità del prodotto senza l'utilizzo di conservanti. Modalità d'uso Instillare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale 4 volte al giorno o secondo parere medico. Dopo l'istillazione tenere chiuso l'occhio per 1 o 2 minuti senza ammiccare. - Al primo utilizzo rimuovere l'anello di plastica che sigilla il tappo tirando la linguetta

laterale. -Togliere il tappo. -Capovolgere il flacone sopra l'occhio e con il dito indice e pollice applicare una pressione crescente sui lati fino alla fuoriuscita della goccia. È possibile che con l'esaurirsi della soluzione contenuta nel flacone sia necessario applicare una forza maggiore. -Richiudere il flacone con il tappo. Componenti Componente principale: sodio cloruro, sodio lattobionato. Altri componenti: idrossietilcellulosa, polivinilpirrolidone, poliossietilene-poliossipropilene copolimero, polietilenglicole, acido bórico, disodio tetraborato decaidrato, acqua per preparazioni iniettabili. Avvertenze Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno. Per eliminare il rischio di contaminazione della soluzione, evitare che il contagocce entri in contatto con l'occhio o con altri oggetti. Per evitare lesioni della superficie oculare evitare che durante l'instillazione il contagocce entri in contatto con l'occhio. Con il progressivo esaurimento della soluzione nel flacone sarà necessario applicare maggior forza per determinare l'uscita della goccia. Richiudere bene in flacone dopo l'uso. In caso di somministrazione concomitante di farmaci oftalmici topici, consultare il medico. Non utilizzare il prodotto se il flacone OSD è danneggiato. Tenere il preparato fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Controindicazioni: ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto o altre sostanze strettamente correlate da un punto di vista chimico. Effetti collaterali: non sono noti effetti indesiderati dopo la somministrazione del prodotto. In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare un medico. Dopo l'applicazione del prodotto può risultare un lieve bruciore oculare e transitorio fastidio visivo. Conservazione Non conservare al di sopra di 25°C. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta del flacone. Dopo prima apertura, il prodotto può essere utilizzato fino alla data di scadenza indicata sul confezionamento. Non disperdere nell'ambiente. Validità a confezionamento integro: 24 mesi. Formato Flacone da 10 ml. Cod. 1020810IT4