

LIBENAR 18 FIALE AEROSOL IPERTONICHE 3%

Marchio: LIBENAR
Codice Min.: 975197474
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Libenar AEROSOL 3%
Descrizione Libenar Aerosol, soluzione salina ipertonica sterile al 3%, è indicato per facilitare l'eliminazione di muco e secrezioni e prevenire la secchezza della mucosa bronchiale. Utile anche in caso di fibrosi cistica, bronchiectasia e bronchiolite. L'uso in aerosolterapia di Libenar Aerosol: - fluidifica le secrezioni nel tratto respiratorio inferiore per effetto osmotico, per esempio nei casi di fibrosi cistica, bronchiectasie e bronchioliti; - previene la secchezza della mucosa bronchiale. Questa soluzione salina ipertonica al 3% per inalazione può essere utilizzata con nebulizzatori

pneumatici o a ultrasuoni. Si raccomanda di seguire le istruzioni d'uso del fabbricante fornite con l'apparecchio. Modalità d'uso 1) Rompere il flaconcino e aprilo ruotando la parte superiore. 2) Versare la soluzione per inalazione nel nebulizzatore. 3) Usare il nebulizzatore secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. N.B. La dose raccomandata di soluzione salina ipertonica al 3% per inalazione è di un flaconcino monodose da 2 a 4 volte al giorno. Componenti Cloruro di sodio 3 g - acqua purificata q.b. a 100 ml Non contiene conservanti. Avvertenze Ogni flaconcino va usato una sola volta. Strettamente riservato all'uso per inalazione. Non adatto per iniezioni. Prima dell'utilizzo, verificare che il flaconcino monodose sia integro. Non utilizzare se danneggiato. Seguire le istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante del nebulizzatore. Se è presente una tendenza a dispnea o ipersensibilità, la soluzione per inalazione non deve essere usata senza la supervisione di un medico. Non usare insieme ad altri medicinali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non usare dopo la data di scadenza indicata. Non riutilizzare il flaconcino se è già stato aperto: non contiene conservanti, pertanto si rischierebbe di utilizzare una soluzione contaminata. In rari casi, possono verificarsi irritazioni temporanee (ad esempio tosse) o costrizione reversibile dei bronchi. Si raccomanda il pre-trattamento con farmaci broncodilatatori. Se si verificano effetti indesiderati, interrompere il trattamento e chiedere consiglio al proprio medico o al farmacista. Formato 18 flaconcini monodose da 4 ml.