

## LIOTONTRAUMA\*gel 40 g 2% + 5%

**Marchio:** LIOTON  
**Codice Min.:** 037375021  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE** LIOTONTRAUMA 2% + 5%  
**GEL**  
**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Farmaci per uso topico, per dolori articolari e muscolari.  
**PRINCIPI ATTIVI** 100 g di gel contengono: Escina 2 g, dietilamina salicilato 5 g.  
**ECCIPIENTI** Essenza lavanda, essenza nerolene, carbossipolimetilene, meglumina, glicol propilenico, alcol etilico, sodio edetato, esildecanolo e esildecil laurato, etossidiglicol, butilidrossitoluolo, titanio diossido, acqua depurata.  
**INDICAZIONI** Traumatologia minore.  
**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Applicare

solamente sulla cute intatta. Il gel non va impiegato su lesioni aperte (ferite), mucose ed aree cutanee trattate con radiazioni. Non applicare contemporaneamente nella stessa zona di altri medicinali ad uso cutaneo. L'uso nei bambini di eta' inferiore ai 12 anni e' controindicato. Non usare per periodi prolungati senza il consiglio di un medico.  
**POSOLOGIA** Applicare e spalmare un sottile strato del gel sulla cute della zona da trattare da 1 a 3 volte al giorno.  
**CONSERVAZIONE** Non conservare a temperatura superiore a 30 gradi C.  
**AVVERTENZE** Trattandosi di un preparato per applicazioni topiche, il suo uso deve essere esclusivamente esterno. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Evitare il contatto con gli occhi. Informazioni importanti su alcuni eccipienti- Il gel contiene glicole propilenico che puo' causare irritazione cutanea. Il gel contiene butilidrossitoluolo (o butilidrossitoluene) che puo' provocare reazioni cutanee locali (ad es. dermatite da contatto), o irritazioni degli occhi e delle mucose.  
**INTERAZIONI** Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali.  
**EFFETTI INDESIDERATI** Disturbi del sistema immunitario: in rari casi possono comparire reazioni di ipersensibilita' come rossore, desquamazione e disidratazione della pelle. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: dermatite da contatto. Segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione.  
**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Non esistono dati relativi all'uso in donne in gravidanza. L'uso e' sconsigliato durante la gravidanza se non sotto stretto controllo medico. E' tuttavia opportuno evitare l'uso prolungato (massimo 3 settimane) del prodotto su aree cutanee estese durante la gravidanza. Evitare l'uso del gel sul seno durante l'allattamento.