

LITHOSOLV 100 COMPRESSE RETARD

Marchio: LITHOSOLV
Codice Min.: 931042220
Link: [clicca qui per acquistare](#)



LITHOSOLV Descrizione Integratore alimentare di sali alcalini di potassio di particolare aiuto nei soggetti sottoposti ad un'intensa perdita di liquidi, come forte sudorazione, diuresi o diarrea, o in pazienti in terapia con farmaci quali diuretici, lassativi o cortisonici. LITHOSOLV è inoltre in grado correggere l'eccessivo carico acido, valutabile in modo diretto attraverso la misurazione del pH urinario; questa può essere effettuata facilmente attraverso l'uso delle strisce allegate alla confezione. Ingredienti Citrato tribasico di potassio. Caratteristiche nutrizionali Valori medi per 2 compresse Citrato di potassio 2.160 mg (pari a 781,94 mg di potassio) Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione di due compresse al giorno, salvo diversa indicazione medica. LITHOSOLV è da assumersi preferibilmente a

stomaco pieno, assumendo la compressa con un po' d'acqua. Per indicazioni diverse (prevenzione delle calcolosi renale) attenersi alla prescrizione medica. **USO DELLE STRISCE DEL pH** Raccogliere l'urina in un contenitore. Con le mani asciutte, prelevare una striscia dalla bustina trasparente e immergerla nell'urina per 1 secondo; estrarla e far sgocciolare l'urina in eccesso. La parte bagnata della striscia assumerà una colorazione diversa a seconda del pH dell'urina. Entro 2 minuti confrontare il colore della striscia con quello presente sulla scala colori di riferimento, presente nella confezione. Leggere il valore corrispondente al colore che più si avvicina a quello della striscia. Le strisce monouso vanno gettate nei rifiuti domestici dopo l'uso. Nota: eventuali modifiche nella colorazione delle strisce non utilizzate, non compromettono la loro precisione. Avvertenze Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. LITHOSOLV è controindicato in pazienti affetti da iperkaliemia o da ipermagnesemia, o da condizioni che possano predisporre alla comparsa di tali alterazioni plasmatiche. Queste condizioni comprendono insufficienza renale cronica, diabete mellito non controllato. La contemporanea assunzione di LITHOSOLV e di farmaci risparmiatori di potassio (triamterene, spironolattone, amiloride) potrebbe determinare iperkaliemia. Si consiglia quindi di monitorare l'andamento della kaliemia. Non sono note interazioni con altri farmaci. Raramente, durante il trattamento, si possono sviluppare lievi disturbi gastrointestinali quali: pesantezza addominale, nausea e occasionalmente diarrea. La confezione in compresse può essere particolarmente indicata in questi soggetti. Conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto, a temperatura ambiente. Termine ultimo di conservazione dalla data di produzione, in confezione integra: 24 mesi. Formato Confezione da 100 compresse da 1,23 g. Cod. 01021