

LITHOSOLV 60 BUSTINE

Marchio: LITHOSOLV
Codice Min.: 940016823
Link: [clicca qui per acquistare](#)



LITHOSOLV Descrizione Integratore alimentare di sali alcalini di potassio di particolare aiuto nei soggetti sottoposti ad un'intensa perdita di liquidi, come forte sudorazione, diuresi o diarrea, o in pazienti in terapia con farmaci quali diuretici, lassativi o cortisonici. LITHOSOLV BUSTINE è inoltre in grado correggere l'eccessivo carico acido, valutabile in modo diretto attraverso la misurazione del pH urinario; questa può essere effettuata facilmente attraverso l'uso delle strisce allegate alla confezione. **Ingredienti** Citrato tribasico di potassio. **Caratteristiche nutrizionali** Valori medi per 2 bustine Citrato di potassio 4.000 mg (pari a 1.531 mg di

potassio) **Modalità d'uso** La bustina di LITHOSOLV BUSTINE disciolta in un bicchiere di acqua consente di preparare una piacevole bevanda al sapore di agrumi. Si consiglia l'assunzione di una o due bustine di LITHOSOLV BUSTINE al giorno. Per indicazioni diverse (prevenzione delle calcolosi renale) attenersi alla prescrizione medica. **USO DELLE STRISCE DEL pH** Raccogliere l'urina in un contenitore. Con le mani asciutte, prelevare una striscia dalla bustina trasparente e immergerla nell'urina per 1 secondo; estrarla e far sgocciolare l'urina in eccesso. La parte bagnata della striscia assumerà una colorazione diversa a seconda del pH dell'urina. Entro 2 minuti confrontare il colore della striscia con quello presente sulla scala colori di riferimento, presente nella confezione. Leggere il valore corrispondente al colore che più si avvicina a quello della striscia. Le strisce monouso vanno gettate nei rifiuti domestici dopo l'uso. **Nota:** eventuali modifiche nella colorazione delle strisce non utilizzate, non compromettono la loro precisione. **Avvertenze** Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. LITHOSOLV BUSTINE è controindicato in pazienti affetti da iperkaliemia o da ipermagnesemia, o da condizioni che possano predisporre alla comparsa di tali alterazioni plasmatiche. Queste condizioni comprendono insufficienza renale cronica, diabete mellito non controllato. La contemporanea assunzione di LITHOSOLV BUSTINE e di farmaci risparmiatori di potassio potrebbe determinare iperkaliemia. Si consiglia quindi di monitorare l'andamento della kaliemia. Non sono note interazioni con altri farmaci. Raramente, durante il trattamento, si possono sviluppare lievi disturbi gastrointestinali quali: pesantezza addominale, nausea e occasionalmente diarrea. La confezione in compresse può essere particolarmente indicata in questi soggetti. **Formato Confezione** da 60 bustine da 4,7 g. **Cod.** 01050