

## MACMIROR COMPLEX\*12 ovuli vag 500 mg + 200.000 Unità Internazionali

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 023432038  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**DENOMINAZIONE**MACMIROR COMPLEX 500 MG/200.000 U.I. OVULI **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Antimicrobici ed antisettici ginecologici. **PRINCIPI ATTIVI** Ogni ovulo contiene: nifuratel 500 mg; nistatina U.I. 200.000. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. **ECCIPIENTI** Dimetilpolisilossano AK 1000. Componenti la capsula: gelatina; glicerina; sodio etil-4-idrossibenzoato; sodio propil-4-idrossibenzoato; titanio biossido; ferro ossido giallo. **INDICAZIONI** Terapia polivalente delle affezioni vulvovaginali da microorganismi patogeni: candida, trichomonas e batteri. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. **POSOLOGIA** 1 ovulo al giorno. Per ottenere il piu' favorevole effetto terapeutico, e' necessario che gli ovuli vengano portati nella parte piu' alta della vagina. **CONSERVAZIONE** Nulla da segnalare. **AVVERTENZE** L'uso, specie prolungato del prodotto, puo' dare origine a fenomeni disensibilizzazione. Nel caso di comparsa di reazione di ipersensibilita' la somministrazione del farmaco dovra' essere interrotta. Durante il trattamento astenersi dai rapporti sessuali. **INTERAZIONI** Non sono state descritte interazioni farmacologiche con i componenti di MACMIROR COMPLEX. **EFFETTI INDESIDERATI** Non sono stati riportati effetti indesiderati. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Non esistono controindicazioni in merito.