

MAGNESIA EFFERVESCENTE (SELLA)*orale polv eff 115 g limone

Marchio: SELLA
Codice Min.: 000527034
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE MAGNESIA EFFERVESCENTE SELLA **CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICA Antiacidi in associazione con sodio bicarbonato **PRINCIPI ATTIVI** 100 g
contengono: Magnesio idrossido 40 g. **ECCIPIENTI** Sodio bicarbonato, acido tartarico, aroma di limone o
di menta, saccarosio **INDICAZIONI** Purgante, lassativo,
antiacido. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** Ipersensibilita' verso i componenti o altre sostanze
strettamente correlate dal punto di vista chimico. In presenza di addome chirurgico acuto. Pazienti con
compromessa funzionalita' renale. **POSOLOGIA** Come purgante: versare un cucchiaino di Magnesia
Effervescente Sella in un bicchiere d'acqua, agitare e bere alla fine della effervescenza. Se ne consiglia
l'assunzione alla sera o al mattino. Come lassativo: un cucchiaino di Magnesia Effervescente Sella in un
bicchiere d'acqua. Come antiacido: mezzo cucchiaino in poca acqua. Per i bambini, le dosi vanno ridotte
a meta' o meno, secondo l'eta'. Non superare le dosi consigliate. **CONSERVAZIONE** Conservare il
recipiente ben chiuso, al riparo dall'umidita'. **AVVERTENZE** Il prodotto non va usato in caso di:
insufficienza renale grave; insufficienza cardiaca. Va usato con precauzione in caso di: gravidanza;
trattamento con altri farmaci somministrati per os (separare le due somministrazioni di almeno 2 ore);
insufficienza renale lieve (monitorare la magnesemia). Il prodotto contiene zuccheri. Di cio' si tenga
conto in pazienti diabetici e pazienti che seguano regimi dietetici ipocalorici. Non usare per trattamenti
prolungati. L'uso continuativo di lassativi puo' provocare assuefazione o danno di diverso tipo. Non
usare lassativi se sono presenti dolori addominali, nausea o vomito. Se la costipazione e' ostinata,
consultare il medico. In caso di malattie renali, da usare solo dietro prescrizione medica. Dopo un breve
periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico. **INTERAZIONI** I sali di magnesio,
assunti per via orale a scopo antiacido o lassativo, possono modificare la farmacocinetica di vari farmaci
assunti contemporaneamente. Tali interazioni si esercitano attraverso vari meccanismi: accelerando lo
svuotamento gastrico; riducendo l'assorbimento dei farmaci associati, per la formazione di complessi
insolubili; modificando la funzione secretiva e motoria dell'intestino, secondariamente
all'alcalinizzazione. I sali di magnesio: riducono l'assorbimento di indometacrone, nitrofurantoina,
aminofillina, clordiazepossido; aumentano l'assorbimento di dicumarolici; riducono l'assorbimento e la
biodisponibilita' orale di tetracicline, anticolinergici, cimetidina, digossina; rinforzano l'azione dei
miorilassanti periferici. **EFFETTI INDESIDERATI** Il permagnesemia, in caso di somministrazioni prolungate
o ad alte dosi. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** I purganti a base di magnesio vanno usati con molta
cautela in caso di gravidanza. E', comunque, consigliato l'uso solo dopo aver consultato il medico.