

MELLIN AD LATTE POLVERE 400 G

Marchio: MELLIN
Codice Min.: 905026694
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Mellin AD Descrizione Alimento dietetico destinato a fini medici speciali per il regime alimentare di lattanti in caso di diarrea. Mellin AD è privo di lattosio. La sua formula è integrata con LC-PUFA e nucleotidi. Dalla nascita. Ingredienti Sciroppo di glucosio, oli vegetali (olio di palma, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di cocco, olio di semi di girasole, olio estratto da Mortierella alpina), caseinato (da latte), trisodio citrato, tripotassio citrato, tricalcio fosfato, magnesio cloruro, dipotassio idrogeno fosfato, potassio cloruro, calcio carbonato, olio di pesce, emulsionante: lecitina di soia; L-cisteina idrocloruro, colina cloruro, acido L-ascorbico, taurina, sodio L-ascorbato, L-triptofano, inositolo, ferro solfato, DL-alfa-tocoferil acetato, zinco solfato, uridina 5'-monofosfato sale

sodico, citidina 5'-monofosfato, L-carnitina, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, calcio D-pantotenato, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, D-biotina, rame solfato, acido folico, retinil palmitato, riboflavina, DL-alfa-tocoferolo, manganese solfato, cianocobalamina, tiammina idrocloruro, retinil acetato, colecalciferolo, piridossina idrocloruro, potassio ioduro, fitomenadione, sodio selenito. Caratteristiche nutrizionali Valori nutrizionali mediper 100 g di polvereper 100 ml al 12,8% P/V Energia2150 kJ/kcal275 kJ/66 kcal Grassidi cui acidi grassi saturidi cui acidi grassi monoinsaturidi cui acidi grassi polinsaturidi27,3 g11,1 g10,3 g4,6 g3,5 g1,4 g1,3 g0,6 g Acido linoleico (LA)3690 mg474 mg Acido alfa-linolenico (ALA)681 mg87 mg Acido arachidonico (AA)91 mg12 mg Acido eicosapentaenoico (EPA)11 mg1,4 mg Acido docosaesaenoico (DHA)52 mg6,7 mg Carboidratidi cui zuccheri57,1 g8,4 g7,3 g1,1 g Fibre0,0 g0,0 g Proteinecaseina10,3 g10,1 g1,3 g1,3 g Sale0,34 g0.043 g Vitamina A429 mcg55 mcg Vitamina D9,3 mcg1,2 mcg Vitamina E11 mcg1,4 mcg Vitamina K35 mcg4,5 mcg Vitamina C73 mg9,3 mcg Tiammina (vitamina B1)0,0387 mg0,050 mg Riboflavina (vitamina B2)0,079 mg0,100 mg Niacina3,4 mg0,43 mg Vitamina B60,309 mg0,040 mg Acido folico70 mcg8,9 mcg Vitamina B120,85 mcg0,11 mcg Biotina14 mcg1,8 mcg Acido pantotenico2,578 mg0,331 mg Sodio134 mg17 mg Potassio509 mg65 mg Cloruro317 mg41 mg Calcio426 mg55 mg Fosforo236 mg30 mg Magnesio40 mg5,1 mg Ferro6,1 mg0,79 mg Zinco4,4 mg0,56 mg Rame0,326 mcg42 mcg Manganese0,264 mg0,034 mg Selenio12 mcg16 mcg Iodio93 mcg12 mcg Colina78 mg10,0 mg Inositolo29 mg3,8 mg L-carnitina7 mg0,90 mg Taurina41 mg5,3 mg NucleotidiCitidina 5'-MonofosfatoUridina 5'-monofosfatoAdenosina 5'-monofosfatoGuanosina 5'-monofosfatoInosina 5'-monofosfato8,5 mg6,0 mg5,3 mg1,8 mg3,5 mg1,1 mg0,77 mg0,67 mg0,23 mg0,45 mg Modalità d'uso Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera. Far bollire la quantità di acqua necessaria e versarla nel biberon alla temperatura di almeno 70°C.Per ottenere un misurino ben livellato dopo averlo riempito, eliminare l'eccesso di polvere usando

un coltello da cucina ben lavato. Aggiungere i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della tabella media di alimentazione. Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere. Raffreddare il biberon mettendolo sotto acqua corrente, in modo che il latte raggiunga la temperatura di 40°C circa. Prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso. Tabella media di alimentazione per biberon La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante. La ricostituzione di Mellin AD è al 12,8% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,3 g circa) ogni 30 ml di acqua.

Età	Numero misurini/ml di acqua	Numero di biberon	nelle 24 ore
1°-2° settimana	2-3	60-90	6
3°-4° settimana	3-4	90-120	6
2° mese	4-5	120-150	5
3° mese	5-6	150-180	5
4° mese	6-7	180-210	5
5° mese	7-8	210-240	5
6° mese	7-8	210-240	4
Dal 7° mese e oltre	7-8	210-240	2

Avvertenze Mellin AD può essere utilizzato solo sotto controllo del Pediatra. Il prodotto è adatto per essere utilizzato come unica fonte di nutrimento nei primi sei mesi di vita. Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale. Si raccomanda di preparare il latte solo al momento del pasto e di consumarlo entro mezz'ora. Non riscaldare o bollire il latte una volta preparato. Non riutilizzare l'eventuale latte avanzato. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione. Importante: il latte materno è l'alimento ideale per il lattante e dovrebbe essere favorito e utilizzato fino a quando è possibile. Seguire con cura le indicazioni. Una preparazione e modalità di utilizzo inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante. Conservazione Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservarla in luogo fresco e asciutto (non in frigorifero). Consumare entro un mese dall'apertura.

Formato Confezione da 400 g Cod. 21986