

MELLIN AR 1 400 G

Marchio: MELLIN
Codice Min.: 979051707
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Mellin AR 1 Descrizione Alimento a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica dei lattanti con rigurgito. Mellin AR 1 è ottenuto mediante un processo esclusivo ed è integrato con farina di semi di carruba, che favorisce la viscosità del prodotto. Ingredienti Lattosio, oli vegetali (palma, cocco, colza a basso contenuto di acido erucico, girasole), latte scremato in polvere, siero di latte demineralizzato (in polvere), galatto-oligosaccaridi da latte (in polvere); addensante: farina di semi di carruba; concentrato di sieroproteine da latte, fosfato di calcio, olio di pesce, sieroproteine da latte (in polvere), frutto-oligosaccaridi, olio estratto da Mortierella alpina, cloruro di colina, citrato di potassio, citrato di sodio, cloruro di potassio, acido L-ascorbico, cloruro di magnesio; emulsionante: lecitina di soia; inositolo, taurina, carbonato di calcio,

solfato ferroso, L-triptofano, solfato di zinco, sodio L-ascorbato, L-carnitina, acetato di DL-alfa-tocoferile, uridina 5'-monofosfato sale sodico, citidina 5'-monofosfato; antiossidante: ascorbil palmitato; adenosina 5'-monofosfato, calcio D-pantotenato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, solfato rameico, DL-alfa-tocoferolo, palmitato di retinile, cloridrato di tiammina, cloridrato di piridossina, riboflavina, acido folico, ioduro di potassio, solfato di manganese, selenito di sodio, fitomenadione, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina. Caratteristiche nutrizionali Valori mediper 100 g di polvereper 100 ml al 13,6% Energia2.024 kJ484 kcal276 kJ66 kcal Grassidi cui saturidi cui monoinsaturidi cui poliinsaturati -acido linoleico (LA) -acido alfa-linolenico (ALA) -acido arachidonico (AA) -acido eicosapentaenoico (EPA) -acido docosaesaenoico (DHA)24,7 g11,0 g9,5 g4,2 g3.300 mg390 mg120 mg30 mg120 mg3,4 g1,5 g1,3 g0,6 g450 mg53,9 mg16,6 mg3,6 mg16,6 mg Carboidrati di cui zuccheri-lattosidi di cui poliolli-inositolo53,4 g52,5 g51,5 g-53 mg7,3 g7,2 g7 g-7,3 mg Fibredi cui GOSdi cui FOSdi cui 3'-galattosil-lattosio5,0 g1,8 g0,29 g0,11 g0,7 g0,24 g0,04 g0,015 g Proteine-sieroproteine-caseine9,7 g3,8 g5,6 g1,3 g0,5 g0,8 g Vitamina A423 mcg58 mcg Vitamina D12 mcg1,6 mcg Vitamina E8,2 mg-TE1,1 mg-TE Vitamina K42 mcg5,8 mcg Vitamina C68 mg9,2 mg Vitamina B1 (Tiamina)0,48 mg0,07 mg Vitamina B2 (Riboflavina)1,0 mg0,14 mg Niacina3,2 mg0,43 mg Vitamina B60,339 mg0,046 mg Folato101 mcg14 mcg Vitamina B120,60 mcg0,08 mcg Acido pantotenico3,7 mg0,50 mg Biotina12 mcg1,7 mcg Calcio580 mg79 mg Fosforo374 mg51 mg Potassio553 mg75 mg Sodio161 mg22,0 mg Cloruro388 mg53 mg Ferro5,8 mg0,79 mg Zinco4,6 mg0,63 mg Iodio92 mcg13 mcg Selenio22 mcg3,0 mcg Rame0,382 mg0,052 mg Magnesio38 mg5,1 mg Manganese0,027 mg0,004 mg Cromo≤44 mcg≤5,9 mcg Molibdeno≤44 mcg≤5,9 mcg Fluoruro≤0,044 mg≤0,0059 mg GOS (Carboidrati non calorici)0,8 g0,1 g Colina160 mg22 mg L-carnitina15 mg2,1 mg Taurina39 mg5,3 mg Citidina 5'-monofosfato 5,6 mg0,77 mg Uridina 5'-monofosfato4,2 mg0,57 mg Adenosina 5'-monofosfato3,5 mg0,48 mg Guanosina 5'-monofosfato1,2

mg0,17 mg inosina 5'-monofosfato2,3 mg0,32 mg Modalità d'uso La ricostituzione di Mellin AR 1 è al 13,6% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,6 g circa) ogni 30 ml di acqua. Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera. Far bollire la quantità di acqua necessaria e versarla nel biberon quando è tiepida. Per ottenere un misurino ben livellato, dopo averlo riempito, eliminare l'eccesso di polvere usando un coltello da cucina ben lavato. Aggiungere i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della Tabella Media di Alimentazione. Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere. Attendere circa 5 minuti che il prodotto si addensi. Prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso. Tabella media di alimentazione EtàN° misuriniml di acqua biberon nelle 24 ore 1°-2° settimana2-360-906 3°-4° settimana3-490-1206 2° mese41206 3° mese51505 4° mese61805-4 5° mese72105-4 6° mese72104 La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante. Avvertenze Seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di conservazione inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante. Il prodotto deve essere utilizzato sotto il controllo del Pediatra. Il prodotto è indicato per lattanti dalla nascita al sesto mese e può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale. Non idoneo a lattanti prematuri. Importante: il latte materno è l'alimento ideale per il lattante e dovrebbe essere favorito e utilizzato fino a quando possibile. Si raccomanda di preparare il latte solo al momento del pasto e consumarlo entro mezz'ora. Non riscaldare o bollire il latte una volta preparato. Non riutilizzare il prodotto preparato eventualmente avanzato. Conservazione Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservata in luogo fresco e asciutto (non in frigorifero). Il prodotto deve essere consumato entro un mese dall'apertura. Validità a confezionamento integro: 18 mesi. Formato Confezione da 400 g. Cod. 149014