

METILE SALICILATO (NOVA ARGENTIA)*ung derm 30 g 10%

Marchio: NOVA ARGENTIA SPA
Codice Min.: 030546016
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE METILE SALICILATO NOVA ARGENTIA 10% UNGUENTO **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari, preparati a base di derivati dell'acido salicilico. **PRINCIPI ATTIVI** 100 g di unguento contengono. Principio attivo: metile salicilato 10,0g. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. **ECCIPIENTI** Eccipienti: vaselina bianca. **INDICAZIONI** Trattamento a breve termine degli stati dolorifici di origine muscolare ed articolare (contusioni, distorsioni, strappi muscolari, lombalgie). **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo, ai salicilati in genere, o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **POSODOLOGIA** Due o tre frizioni al giorno, massaggiando la parte dolente con circa 3-5 g di medicinale (1-2 cm di unguento). Non superare le dosi consigliate; non usare nelle 24 ore una quantita' di unguento superiore ai 20 grammi. Se la sintomatologia dolorosa persiste dopo un breve periodo di trattamento (3-5 giorni), interrompere il trattamento e rivalutare la situazione. **CONSERVAZIONE** Conservare nella confezione originale ben chiusa al riparo dalla luce e dal calore. **AVVERTENZE** L'uso, specie se prolungato, del medicinale puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso, e' necessario interrompere il trattamento. Il medicinale non deve essere applicato su zone di pelle sensibili, irritate o con soluzioni di continuita' (ferite, abrasioni), ne' sulle mucose. Informazioni importanti su alcuni eccipienti: non pertinente **INTERAZIONI** Non sono note interazioni con altri farmaci ne' altre forme di interazione. **EFFETTI INDESIDERATI** Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di Metile salicilato organizzati secondo la classificazione sistemica organica MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. **Disturbi del sistema immunitario:** eruzioni cutanee. **Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo:** dermatiti da contatto, fenomeni irritativi, su base allergica. **Segnalazione delle reazioni avverse sospette:** la segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Gli studi condotti su animali hanno evidenziato una tossicita' riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Il rischio potenziale per gli esseri umani non e' noto. Pertanto, METILE SALICILATO NOVA ARGENTIA non deve essere usato durante la gravidanza, se non in caso di assoluta necessita' e sotto il diretto controllo del medico.