

MICONAL*crema vag 78 g 2% + applic

Marchio: Morgan
Codice Min.: 024625030
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE MICONAL CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Derivati imidazolici. **PRINCIPI ATTIVI** Miconazolo nitrato. **ECCIPIENTI** Crema dermatologica e ginecologica: palmito stearato glicole etilenico, gliceridi poliossietilenati, paraffina liquida, idrossietilidenmetilpirandione sale sodico, butil-idrossianisolo, butil-idrossitoluolo, ascorbile palmitato, acqua depurato. **Polvere:** talco, ossido di zinco, silice precipitata. **Ovuli vaginali:** mono-di-trigliceridi di acidi grassinaturali parzialmente poliossietilenati, poliossietilensorbitan monostearato, etilendietilenglicole. **Capsule vaginali:** paraffina liquida, vaselina bianca, glicerolo,

lecitina di soia, sodio p-ossibenzoato di propile, titanio biossido. **Lavanda vaginale:** glicole propilenico, acidolattico, paraossibenzoato di etilenglicofenlundeciletere, derivato poliossietilenico di trigliceride ricinoleico, acqua depurata. **INDICAZIONI** Crema dermatologica al 2% e polvere dermatologica al 2%: trattamento locale delle infezioni cutanee ed ungueali provocate da dermatofiti o da Candida. Crema ginecologica, ovuli vaginali 50 mg, capsule vaginali 1200 mg, lavanda vaginale 0,2%: trattamento delle infezioni fungine vaginali o vulvo-vaginali in particolare da Candida. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' individuale accertata verso il prodotto o verso altri composti strettamente collegati dal punto di vista chimico. **POSOLOGIA** **Polvere dermatologica 2%:** 1-2 applicazioni/die. **Crema dermatologica 2%:** 1-2 applicazioni/die. **Ovuli vaginali 50 mg:** 2 ovuli vaginali/die (pari a 100 mg/giorno). **Crema ginecologica 2%:** il contenuto dell'applicatore vaginale (5 g di crema) due volte al giorno. **Capsule vaginali 1200mg:** 1 capsula in singola applicazione per 2 giorni consecutivi. **Lavanda vaginale 0,2 %:** 1 lavanda per 5 giorni consecutivi. **Infezioni cutanee:** prima di praticare un'applicazione di miconazolo nitrato, alle lesioni cutanee, l'area infetta deve essere lavata e ben asciutta. In seguito, applicare 1 cm o piu' di crema sulla zona lesa, una-due volte al giorno, splamare con delicatezza, facendo penetrare, frizionando fino al completo assorbimento della crema. Dopo la scomparsa delle lesioni, abitualmente da 2 a 5 settimane, il trattamento va continuato per almeno altri 2 giorni, per prevenire eventuali ricadute. Se le lesioni sono essudanti, deve essere usata anche la polvere di miconazolo nitrato. **Infezioni ungueali:** le unghie infette devono essere, innanzitutto, tagliate piu' corte possibile, lavate ed asciugate prima dell'applicazione di miconazolo nitrato. Applicare un po' di crema 1-2 volte al giorno sull'unghia infetta, poi massaggiare con le dita. Ricopre, poi, l'area con un bendaggio occlusivo non perforato. E' necessario tagliare regolarmente le parti morte e distaccarle con un tagliaunghie, tenendo il letto ungueale e i bordi delle unghie puliti. Il trattamento va continuato ininterrottamente anche dopo la caduta delle unghie infette (in genere dopo 2-

3 mesi) e fino alla definitiva guarigione clinica e micologica. L'impiego contemporaneo o no della polvere e' indicato soprattutto per il trattamento delle lesioni umide. Cospargere le lesioni 1-2 volte al giorno con miconazolo nitrato polvere, proseguendo ininterrottamente il trattamento fino alla scomparsa completa delle lesioni. Modalita' di impiego dell'applicatore crema vaginale: aprire il tubo di crema perforando la chiusura di alluminio con il puntale della capsula di chiusura; avvitare l'applicatore sul tubo; premere il tubo, nella parte terminale, in modo da riempire l'applicatore di crema. In caso di resistenza del pistone, smuoverlo leggermente; togliere l'applicatore e richiudere il tubo; in posizione supina, le ginocchia sollevate ed allargate, introdurre delicatamente l'applicatore in vagina. Spingere il pistone fino al fondo, per completare l'estrusione della crema. Ritirare l'applicatore senza toccare il pistone. L'applicatore deve essere tenuto scrupolosamente deterso e pulito: dopo ogni impiego, lavarlo con acqua tiepida e sapone. Si consiglia la sterilizzazione, seguirne le direttive, tenendo presente che non dovra' essere impiegata acqua a temperatura superiore a 50 gradi C, ne etere. Il pistone puo' essere estratto dal cilindro per una piu' agevole pulizia e completa asciugatura. Conservare l'applicatore in un astuccio o altro contenitore pulito e chiuso. Modalita' di impiego del flacone lavanda vaginale: rompere la parte terminale della capsula di chiusura. Inserire nel forolo la cannula in posizione corretta. Introdurre con delicatezza la cannula in vagina ed esercitare sul flacone una pressione graduale contemporanea ad un leggero movimento rotatorio in modo che l'irrigazione risulti lenta e, possibilmente, omogenea sulle pareti vaginali. CONSERVAZIONE Nessuna. AVVERTENZE L'uso prolungato del farmaco puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso, e' necessario interrompere il trattamento ed istituire una terapia idonea. INTERAZIONI Nessuna conosciuta. EFFETTI INDESIDERATI Uso topico: occasionalmente fenomeni di sensibilizzazione o irritazioni locali, che impongono l'interruzione del trattamento. Uso vaginale: vari disturbi sono stati riferiti nelle prime settimane di terapie con miconazolo: bruciore e irritazione vaginale, crampi pelvici, piu' raramente eruzioni cutanee e cefalea. In questi casi e' necessario interrompere il trattamento e istituire una terapia idonea. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Nelle donne in stato di gravidanza, il prodotto va usato solo in casi di effettiva necessita'.