

MICOXOLAMINA*crema vag 75 g 1%

Marchio: MICOXOLAMINA
Codice Min.: 025235058
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONEMICOXOLAMINA**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**Antimicrobici ed antisettici, escluse le associazioni con corticosteroidi.**PRINCIPI ATTIVI**Ciclopiroxolamina.**ECCIPIENTI**Crema vaginale 1%: etilenglicol e poliossietilenglicol palmitostearici, gliceridi di acidi grassi saturi poliossietilenici, olio di vaselina, acido benzoico, butilidrossianisolo, acqua depurata q.b. Ovuli vaginali 100 mg: acido benzoico, gliceridi semisintetici solidi etossilati.**Schiuma ginecologica 1%:** laurilsolfato di monoetanolamina, polietilenglicole 150 stearato, polisorbato 20, lecitindietanolamide, sodio edetato, alcool benzilico, profumo, acido lattico, acqua depurata q.b.**INDICAZIONI**Crema vaginale 1% e Ovuli Vaginali 100 mg: infezioni vulvovaginali da Candida. Schiuma Ginecologica 1 %: coadiuvante nelle infezioni vulvo-vaginali da Candida.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno degli eccipienti.**POSODOLOGIA**Crema vaginale 1%: introdurre una volta al giorno (prima di coricarsi) o secondo prescrizione medica, 5 g di crema vaginale (il contenuto di 1 applicatore riempito) profondamente in vagina a mezzo dell'accluso applicatore. La terapia deve essere proseguita per almeno 6/7 giorni, anche se la sintomatologia soggettiva (prurito e leucorrea), e' scomparsa nelle prime giornate di trattamento. In funzione della gravita' dell'infezione o per prevenire recidive e' tuttavia consigliabile proseguire il trattamento per una ulteriore settimana. Ovuli vaginali 100 mg: introdurre un ovulo al giorno (la sera prima di coricarsi) profondamente in vagina per almeno tre giorni. In funzione della gravita' dell'infezione o per prevenire recidive la terapia puo' essere protratta per altri 3 giorni. Per impedire una reinfezione e' necessario trattare con la crema anche la zona circostante la vagina (organi genitali esterni fino all'ano). A tale scopo spremere un piccolo quantitativo di crema e applicarla con batuffolo di ovatta sulla parte da trattare. Schiuma ginecologica 1%: e' consigliabile utilizzare la Schiuma 1 o 2 volte al giorno, durante il periodo di trattamento con gli Ovuli e/o la Crema. Si detergono i genitali esterni con 10 cc (1 dose) di schiuma ginecologica disciolti in acqua, senza risciacquare.**CONSERVAZIONE**Nessuna.**AVVERTENZE**L'eventuale comparsa di fenomeni di sensibilizzazione impone la sospensione del trattamento e l'adozione di adeguate misure terapeutiche. E' possibile un'infezione reciproca (effetto "ping-pong") da parte del partner. Per prevenire una reinfezione, anche il partner "sano" dovrebbe essere sottoposto a controllo medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.**INTERAZIONI**Non segnalato in letteratura ne' rilevate nella pratica clinica.**EFFETTI INDESIDERATI**Raramente puo' verificarsi un lieve bruciore nei primi giorni di trattamento.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Nelle donne in gravidanza il prodotto deve essere usato solo in caso di effettiva necessita'.