

MYRIALEN GEL OCULARE 10 G

Marchio: SOOFT ITALIA
Codice Min.: 980115380
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Myrialen gel Descrizione Gel oftalmico sterile contenente dexpanthenolo al 5%, utile a mantenere l'idratazione e la protezione dell'epitelio corneale. Il dexpanthenolo è un derivato dell'acido pantotenico (vitamina B5) che appartiene al complesso delle vitamine del gruppo B, ed è un componente essenziale per un epitelio che funzioni normalmente. Le proprietà del dexpanthenolo permettono al gel di legare l'acqua

formando un film lubrificante e idratante sulla superficie oculare, che prolunga il tempo medio di rottura del film lacrimale nei pazienti con sindrome dell'occhio secco ed altre condizioni implicate nell'occhio secco. La formulazione contiene carbomeri, polimeri sintetici ad alto peso molecolare, che contribuiscono a simulare la normale viscosità delle lacrime. Aiuta a mantenere l'idratazione e la protezione della superficie oculare. Svolge un ruolo nel proteggere la superficie oculare in pazienti con alterazioni del film lacrimale, dando un rapido sollievo. Apporta un sollievo duraturo in caso di irritazione oculare, bruciore e sensazione di corpo estraneo causati da fattori ambientali come vento, sole, aria secca, acqua salata, fumo, luce intensa, aria condizionata, riscaldamento, uso prolungato del computer o chirurgia oculare, congiuntivite o uso di lenti a contatto. Modalità d'uso Instillare 1 goccia per occhio, una o più volte al giorno o secondo parere medico. Al primo utilizzo è necessario rimuovere il sigillo di sicurezza. Togliere il tappo. Capovolgere il tubetto sopra l'occhio e applicare una pressione crescente fino alla fuoriuscita della goccia. Richiudere il tubetto con il tappo. Componenti Componente principale: dexpanthenolo, 5%. Altri componenti: carbomer 980, cetrimide, edetato sodico, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili. Avvertenze - Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno. - In caso di irritazione oculare, interrompere l'utilizzo e consultare un medico. - In rari casi può verificarsi un temporaneo offuscamento visivo dovuto alla viscosità del gel. È quindi consigliabile attendere fino alla scomparsa dell'offuscamento prima di intraprendere qualsiasi attività che richieda una visione chiara. - Evitare che il contagocce entri in contatto con l'occhio o con altri oggetti. - Richiudere bene il tubetto dopo l'uso. - L'utilizzo continuativo di Myrialen gel è per 30 giorni, se i sintomi persistono consultare il medico. - Non indossare lenti a contatto durante l'instillazione del prodotto. Dopo la somministrazione attendere almeno 15 minuti prima di riapplicare le lenti. - In caso di somministrazione concomitante di prodotti oftalmici topici, attendere almeno 15 minuti tra una somministrazione e l'altra. Myrialen gel deve essere instillato come ultimo prodotto. - Non utilizzare il prodotto se il tubetto o il sigillo di sicurezza sono danneggiati. - Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. - Non ingerire. Formato Tubo da 10 g.