

NAN HA 1 800 G

Marchio: NESTLE
Codice Min.: 944957289
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Nestlé NAN HA 1 Descrizione Latte per lattanti. Contribuisce a ridurre il rischio di allergia alle proteine del latte vaccino nei primi mesi di vita. È un latte in polvere per lattanti, per l'alimentazione dalla nascita del lattante che non viene allattato al seno. Indicato nei casi di predisposizione all'allergia alle proteine del latte vaccino, secondo il parere del pediatra. Con acido arachidonico e acido docosaesaenoico e nucleotidi. Dopo Nestlé NAN HA 1 si può passare ad un latte di proseguimento come Nestlé NAN HA 2 Ingredienti Lattosio, oli vegetali (girasole, cocco, colza), concentrati di siero di latte a proteine idrolizzate*, citrato di potassio, glicerofosfato di calcio, sali di calcio dell'acido ortofosforico, cloruro di magnesio, cloruro di calcio, L-arginina, olio di pesce, olio estratto da Mortierella alpina, cloruro di sodio, L-istidina, bitartrato di colina, L-ascorbato di sodio, L-

tirosina, taurina, inositolo, solfato ferroso, solfato di zinco, L-carnitina, 5' monofosfato di citidina, D-pantotenato, calcio, 5' monofosfato di uridina, nicotinamide, acetato di DL-alfa-tocoferile, 5' monofosfato di adenosina, Bifidobacterium lactis CNCM-13466, 5' monofosfato di guanosina, solfato rameico, riboflavina, acetato di retinile, mononitrato di tiamina, cloridrato di piridossina, solfato di manganese, ioduro di potassio, acido folico, fillochinone, selenato di sodio, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina. *l'enzima utilizzato è di origine non Halal/Kosher Caratteristiche nutrizionali Valori medi per 100 g per 100 ml al 13,1% p/v Energia 2.138 kJ 511 kcal 280 kJ 67 kcal Grassi, di cui: acidi grassi saturi acido linoleico acido alfa-linolenico acido docosaesaenoico acido arachidonico 26,1 g 6,1 g 4.000 mg 340 mg 57 mg 57 mg 3,4 g 0,8 g 524 mg 44 mg 7,5 mg 7,5 mg Carboidrati di cui zuccheri 59,4 g 59,4 g 7,8 g 7,8 g Lattosio 59,4 g 7,8 g Proteine 9,7 g 1,3 g Sale 0,48 g 0,06 g Vitamina A 495 mcg-RE 64,9 mcg-RE Vitamina D 8 mcg 1 mcg Vitamina E 11 mg-TE 1,4 mg-TE Vitamina K 37 mcg 4,9 mcg Vitamina C 65 mg 8,5 mg Tiamina 0,49 mg 0,06 mg Riboflavina 1,1 mg 0,14 mg Niacina 5,6 mg 0,73 mg Vitamina B6 0,36 mg 0,05 mg Acido folico 83 mcg 10,9 mcg Vitamina B12 1,3 mcg 0,17 mcg Biotina 12 mcg 1,6 mcg Acido pantotenico 5,5 mg 0,72 mg Sodio 190 mg 25 mg Potassio 552 mg 72,4 mg Cloruro 384 mg 50,3 mg Calcio 335 mg 43,9 mg Fosforo 186 mg 24,4 mg Magnesio 50 mg 6,56 mg Ferro 5,2 mg 0,68 mg Zinco 5 mg 0,66 mg Rame 410 mcg 54 mcg Manganese 100 mcg 13 mcg Fluoruro ≤60 mcg ≤7,9 mcg Selenio 16 mcg 2 mcg Iodio 80 mcg 10,5 mcg Taurina 30 mg 3,9 mg Colina 55 mg 7,2 mg Inositolo 35 mg 4,6 mg L-carnitina 14 mg 1,9 mg Nucleotidi 15 mg 2 mg Modalità d'uso 1. Lavarsi ed asciugarsi le mani. 2. Lavare con cura biberon, tettarella e ghiera. Bollire il tutto per 5 minuti e tenerli coperti fino all'uso. 3. Bollire per 5 minuti acqua potabile e lasciarla intiepidire. 4. Seguire attentamente la Tabella di Alimentazione. Versare nel biberon la quantità di acqua indicata: aggiungere poi il numero di misurini rasi di polvere indicato. 5. Assicurarci che il misurino sia

asciutto e riporlo nel barattolo, appoggiandolo sul bordo interno. 6. Chiudere il biberon, agitare fino a completa dissoluzione della polvere. Verificare la temperatura del latte prima di somministrarlo. Preparare solamente un biberon alla volta. Preparare il latte solo al momento del pasto e consumarlo subito.

Tabella di Alimentazione		Età del lattante		Acqua		N° misurini		Biberon al giorno			
1° e 2° settimana	90 ml	3	6	3° e 4° settimana	120 ml	4	5	2° mese	150 ml	5	5
3° e 4° mese	180 ml	6	5	5° e 6° mese	210 ml	7	5				

*Per mantenere in vita il maggior numero di fermenti lattici, l'acqua bollita deve essere raffreddata a temperatura idonea per il lattante prima di aggiungere la polvere **Usare esclusivamente il misurino all'interno della confezione. L'uso di quantità maggiori o minori di polvere rispetto a quelle indicate può essere causa di disidratazione o di ridotto apporto nutrizionale. Non cambiare le quantità indicate senza il parere medico. Avvertenze Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante e l'allattamento al seno dovrebbe durare più a lungo possibile. In mancanza totale o parziale del latte materno, prima di scegliere un latte per lattanti, è necessario interpellare il pediatra. Non utilizzare in caso di allergia già manifesta alle proteine del latte vaccino. Evitare di conservare il prodotto ad alte temperature per un periodo prolungato di tempo. Non conservare il latte avanzato nel biberon. Non lasciare il lattante da solo durante la poppata per evitare che soffochi. Seguire le istruzioni esattamente. L'uso di acqua e biberon non bolliti, la ricostituzione, la conservazione, la preparazione o la somministrazione non corrette possono essere causa di rischi per la salute del lattante. Conservazione Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore. Validità a confezione integra: 24 mesi. Validità dopo la prima apertura: 3 settimane. Formato Barattolo da 800 g con misurino da 4,4 g. Cod. 12430308