

NAN HA 2 800 G

Marchio: NESTLE
Codice Min.: 944957291
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Nestlé NAN HA 2 Descrizione Latte di proseguimento da 6 mesi. Latte in polvere indicato per l'alimentazione del lattante a partire da 6 mesi di vita. Formulato per far parte di un'alimentazione diversificata, da iniziare secondo le indicazioni del pediatra. Non deve essere utilizzato in sostituzione del latte materno nei primi 6 mesi di vita. In assenza del latte materno è importante utilizzare il latte di proseguimento fino ad un anno di età. Con sieroproteine parzialmente idrolizzate, LC PUFA (acidi grassi polinsaturi a lunga catena), DHA, acido arachidonico e Bifidobacterium lactis. Ingredienti Lattosio, oli vegetali (girasole, cocco, colza), concentrati di siero di latte a proteine idrolizzate*, glicerofosfato di calcio, sali di calcio dell'acido ortofosforico, olio di pesce, citrato di potassio, cloruro di calcio, cloruro di magnesio, olio estratto da Mortierella

alpina, L-arginina, L-istidina, L-ascorbato di sodio, L-tirosina, cloruro di sodio, solfato ferroso, solfato di zinco, D-pantotenato, calcio, acetato di DL-alfa-tocoferile, nicotinamide, Bifidobacterium lactis CNCM-13466, solfato rameico, riboflavina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, cloridrato di piridossina, solfato di manganese, ioduro di potassio, acido folico, selenato di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina. *l'enzima utilizzato è di origine non Halal/Kosher

Caratteristiche nutrizionali

Valori medi per 100 g per 100 ml al 13,7% p/v		
Energia	2.050 kJ	490 kcal
Grassi, di cui:		
acidi grassi saturi	280 kJ	67 kcal
acido linoleico	23,3 g	2,3 g
acido alfa-linolenico	3.450 mg	295 mg
acido docosaesaenoico	123 mg	123 mg
acido arachidonico	3,2 g	0,3 g
Carboidrati di cui zuccheri	472 mg	40 mg
Lattosio	8,3 mg	8,3 mg
Proteine	60,8 g	8,3 g
Vitamina A	9,3 g	1,3 g
Vitamina D	420 mcg-RE	57,4 mcg-RE
Vitamina E	12 mcg	1,7 mcg
TE	11 mg-TE	1,5 mg-TE
Vitamina K	38 mcg	5,1 mcg
Vitamina C	61 mg	8,3 mg
Tiamina	495 mcg	68 mcg
Riboflavina	1.120 mcg	153 mcg
Niacina	4,8 mg	0,65 mg
Vitamina B6	370 mcg	51 mcg
Folato	153 mcg-DFE	20,9 mcg-DFE
Vitamina B12	1,4 mcg	0,18 mcg
Sodio	165 mg	23 mg
Potassio	540 mg	73,8 mg
Cloruro	608 mg	83,1 mg
Calcio	504 mg	68,9 mg
Fosforo	300 mg	41 mg
Magnesio	50 mg	6,83 mg
Ferro	7,3 mg	0,99 mg
Zinco	3,5 mg	0,48 mg
Rame	370 mcg	51 mcg
Manganese	95 mcg	12,9 mcg
Fluoruro	≤ 60 mcg	$\leq 8,2$ mcg
Selenio	96 mcg	3,8 mcg
Iodio	28 mcg	13,1 mcg

Modalità d'uso

1. Lavarsi ed asciugarsi le mani.
2. Lavare con cura biberon, tettarella e ghiera. Bollire il tutto per 5 minuti e tenerli coperti fino all'uso.
3. Bollire per 5 minuti acqua potabile e lasciarla intiepidire.
4. Seguire attentamente la Tabella di Alimentazione. Versare nel biberon la quantità di acqua indicata: aggiungere poi il numero di misurini rasi di polvere indicato.
5. Assicurarsi che il misurino sia asciutto e riporlo nel barattolo, appoggiandolo sul bordo interno.
6. Chiudere il biberon, agitare fino a completa dissoluzione della polvere. Verificare la temperatura del latte prima di somministrarlo. Preparare solamente un biberon alla volta. Preparare il latte solo al momento del pasto

e consumarlo subito. Tabella di Alimentazione Età del lattante Acqua N° misurini Biberon al giorno
Altri pasti al giorno*** dal 6° mese compiuto al 9° mese 210 ml 7 4-3 1-2 dal 9° mese compiuto e
seguenti 210 ml 7 3-2 2-3 *Per mantenere in vita il maggior numero di fermenti lattici, l'acqua bollita
deve essere raffreddata a temperatura idonea per il lattante prima di aggiungere la polvere **Usare
esclusivamente il misurino all'interno della confezione. L'uso di quantità maggiori o minori di polvere
rispetto a quelle indicate può essere causa di disidratazione o di ridotto apporto nutrizionale. Non
cambiare le quantità indicate senza il parere medico. ***A questa età, la dieta del lattante diventa
sempre più diversificata. Consultare il pediatra prima di introdurre qualsiasi nuovo cibo all'interno della
dieta del lattante. Qualora il pediatra raccomandi un'introduzione anticipata di nuovi cibi, ridurre
l'assunzione del latte di proseguimento come suggerito. Avvertenze Il latte materno è l'alimento ideale
per il lattante e l'allattamento al seno dovrebbe durare più a lungo possibile. In mancanza totale o
parziale del latte materno, prima di scegliere un latte per lattanti, è necessario interpellare il pediatra.
Non utilizzare in caso di allergia già manifesta alle proteine del latte vaccino. Evitare di conservare il
prodotto ad alte temperature per un periodo prolungato di tempo. Non conservare il latte avanzato nel
biberon. Non lasciare il lattante da solo durante la poppata per evitare che soffochi. Seguire le istruzioni
esattamente. L'uso di acqua e biberon non bolliti, la ricostituzione, la conservazione, la preparazione o
la somministrazione non corrette possono essere causa di rischi per la salute del lattante.
Conservazione Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore. Validità a confezione integra: 24
mesi. Validità dopo la prima apertura: 4 settimane. Formato Barattolo da 800 g con misurino da 4,6 g.
Cod. 12468665