

## NAN SUPREME PRO 2 800 G

**Marchio:** NESTLE  
**Codice Min.:** 941437170  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

Nestlé NAN SUPREME pro 2 Descrizione Latte di proseguimento in polvere indicato per l'alimentazione del lattante a partire da 6 mesi di vita. È formulato per far parte di una alimentazione diversificata, da iniziare secondo le indicazioni del pediatra. Non deve essere utilizzato in sostituzione del latte materno nei primi 6 mesi di vita. In assenza del latte materno è importante utilizzare il latte di proseguimento fino ad un anno di età. Ingredienti Lattosio, oli vegetali (girasole, colza), concentrato di siero di latte a proteine idrolizzate\*, glicerofosfato di calcio, sali di calcio dell'acido ortofosforico, olio di pesce, cloruro di calcio, cloruro di magnesio, citrato di potassio, olio estratto da Mortierella alpina, cloruro di potassio, miscela 2'-fucosillattosio/difucosillattosio (2'-FL/DFL) (contiene lattosio), L-arginina, citrato di sodio, L-istidina, L-ascorbato di sodio, latte-N-tetraosio (LNT) (contiene lattosio), L-tirosina, sale sodico di 6'-sialil-lattosio (6'-SL) (contiene lattosio), L. reuteri DSM17938\*\*, solfato ferroso, cloruro di sodio, solfato di zinco, sale sodico di 3'-sialil-lattosio (3'-SL) (contiene lattosio), D-pantotenato, calcio, acetato di DL-alfatocoferile, nicotinamide, solfato rameico, riboflavina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, cloridrato di piridossina, solfato di manganese, ioduro di potassio, acido folico, selenato di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina. \*L'enzima utilizzato è di origine Halal/Kosher. \*\*Licenza di BioGaia AB. Senza glutine. Caratteristiche nutrizionali Valori medi per 100 g di polvere per 100 ml

Energia	2.050 kJ/490 kcal	280 kJ/67 kcal	Grassi di cui acidi grassi saturi	23,3 g/2,3 g	3,2 g/0,3 g
Acido linoleico	3.450 mg	472 mg	Acido alfa-linolenico	295 mg	40 mg
Acido docosaesaenoico (DHA)	123 mg	16,8 mg	Acido arachidonico (ARA)	123 mg	16,8 mg
Carboidrati di cui zuccheri	60,6 g/60,6 g	8,3 g/8,3 g	Lattosio	60,6 g	8,3 g
Fibre	0,4 g	0,05 g	2'-fucosillattosio (HiMO)	0,213 g	0,029 g
Difucosillattosio (HiMO)	0,029 g	0,004 g	Latto-N-tetraosio (HiMO)	0,070 g	0,010 g
6'-sial-lattosio (HiMO)	0,033 g	0,004 g	3'-sial-lattosio (HiMO)	0,007 g	0,001 g
Proteine	9,3 g	1,3 g	Vitamina A	420 mcg-RE	57,4 mcg-RE
Vitamina D	12 mcg	1,7 mcg	Tiamina (vitamina B1)	495 mcg	68 mcg
Riboflavina (vitamina B2)	1.125 mcg	154 mcg	Niacina (vitamina B3)	4,8 mg	0,65 mcg
Acido pantotenico (vitamina B5)	5,5 mg	0,75 mcg	Vitamina B6	370 mcg	51 mcg
Biotina (vitamina B7)	14 mcg	1,9 mcg	Folato	154 mcg-DFE	21,1 mcg-DFE
Vitamina B12	1,4 mcg	0,18 mcg	Vitamina C	63 mg	8,6 mg
Vitamina K	38 mcg	5,1 mcg	Vitamina E	11 mg-TE	1,5 mg-TE
Sodio	185 mg	25 mg	Potassio	550 mg	75,2 mg
Cloruro	4491 mg	67,1 mg	Calcio	504 mg	68,9 mg
Fosforo	300 mg	41 mg	Magnesio	50 mg	6,84 mg
Ferro	7,3 mg	1 mg	Zinco	3,5 mg	0,48 mg
Rame	370 mcg	51 mcg	Iodio	102 mcg	13,9 mcg
Selenio	27 mcg	3,6 mcg	Manganese	97 mcg	13 mcg
Fluoruro					

Modalità d'uso Lavarsi ed asciugarsi accuratamente le mani. Lavare con cura biberon, tettarella e ghiera. Bollire il tutto per 5 minuti e tenerli coperti fino all'uso. Bollire per 5 minuti acqua potabile e lasciarla intiepidire. Seguire attentamente la Tabella di Alimentazione. Versare nel biberon la quantità di acqua indicata; aggiungere poi il numero di misurini rasi di polvere indicato. Assicurarsi che il misurino sia asciutto e riporlo nel barattolo, appoggiandolo sul bordo intero. Chiudere accuratamente il barattolo. Chiudere il

biberon e agitarlo fino a completa dissoluzione della polvere. Verificare la temperatura del latte prima di somministrarlo. Tabella di Alimentazione

Età del lattante	Acqua precedentemente bollita (ml)*	N° di misurini**	Biberon	Altro
Dal 6° mese compiuto al 9° mese	210	7	4-3	1-2***
Dal 9° compiuto e seguenti	210	7	3-2	2-3***

\*Per mantenere in vita il maggior numero di fermenti lattici, l'acqua bollita deve essere raffreddata a temperatura idonea per il lattante prima di aggiungere la polvere. \*\*Usare esclusivamente il misurino all'interno della confezione. L'uso di quantità maggiori o minori di polvere rispetto a quelle indicate può essere causa di disidratazione o di ridotto apporto nutrizionale. Non cambiare le quantità indicate senza il parere medico. \*\*\*Consultare il pediatra prima di introdurre qualsiasi nuovo cibo all'interno della dieta del lattante. Qualora il pediatra raccomandi un'introduzione anticipata di nuovi cibi, ridurre l'assunzione del latte di proseguimento come suggerito. Avvertenze Preparare solamente un biberon alla volta. Preparare il latte solo al momento del pasto e consumarlo subito. Non conservare mai il latte avanzato nel biberon. Verificare sul dorso della mano la temperatura del latte prima di somministrarlo. Non lasciare mai il lattante da solo durante la poppata per evitare che soffochi. Seguire le istruzioni esattamente. L'uso di acqua e biberon non bolliti, la ricostituzione, la conservazione, la manipolazione, la preparazione o la somministrazione non corrette possono essere causa di rischi per la salute del lattante. Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante e l'allattamento al seno dovrebbe durare più a lungo possibile. In mancanza totale o parziale del latte materno, prima di scegliere un latte di proseguimento è necessario interpellare il pediatra. Conservazione Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare di conservare il prodotto ad alte temperature per un periodo prolungato di tempo. Validità post-apertura: 1 mese. Formato Barattolo da 800 g. Cod. 12467163