

NEOBOROCILLINA C*16 pastiglie 1,2 mg + 70 mg senza zucchero

Marchio: NEOBOROCILLINA
Codice Min.: 022632184
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE NEO BOROCILLINA "1,2 MG + 70 MG PASTIGLIE CON VITAMINA C SENZA ZUCCHERO"**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Antisettici del cavo orofaringeo.**PRINCIPI ATTIVI** 2,4 diclorobenzil alcool; acido ascorbico.**ECCIPIENTI** Mannitolo, polivinilpirrolidone K 30, copolyvidone, aroma arancia, gliceril beenato, aspartame.**INDICAZIONI** Antisettico del cavo orofaringeo.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti; per la presenza di aspartame, il prodotto e' controindicato in casodi fenilchetonuria.**POSOLOGIA** Sciogliere lentamente in bocca una pastiglia ogni 2-3 ore, fino ad un massimo giornaliero di 8 pastiglie. Non superare le dosi consigliate.**CONSERVAZIONE** Conservare a temperatura non superiore a 30 gradi C.**AVVERTENZE** Le pastiglie senza zucchero contengono vitamina C, pertanto devono essere usate con cautela da soggetti che soffrono, o abbiano sofferto in passato, di nefrolitiasi (calcolosi renale) e da quelli affetti da Deficit di G6PD (Glucosio-6-fostato deidrogenasi), emocromatosi, talassemia o anemia sideroblastica. Il prodotto non contiene saccarosio, puo' quindi essere assunto da chi deve evitare la somministrazione di tale zucchero. L'impiego, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico orale puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso e' necessario interrompere il trattamento e istituire una eventuale idonea terapia.**INTERAZIONI** Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici.**EFFETTI INDESIDERATI** Sono stati segnalati molto raramente: reazioni di ipersensibilita', sensazione di giramento di testa, insufficienza respiratoria, edema della glottide, vomito, malessere, sudorazione, edema delle braccia, edema periorale, edema delle palpebre, edema del volto, orticaria, anemia emolitica, ittero.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso di 2,4-diclorobenzil alcool e acido ascorbico in donne in gravidanza. Nelle donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento, il prodotto va somministrato in caso di effettiva necessita'.