

NEIODARSOLO*orale soluz 10 flaconcini 15 ml

Marchio: LABORATORI
BALDACCI

Codice Min.: 023296039

Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONENEIODARSOLO**CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICAApparato gastrointestinale e
metabolismo; tonici.**PRINCIPI ATTIVI**L-arginina L-2 pirrolidon-5-
carbossilato mg 300; cianocobalamina mcg
50.**ECCIPIENTI**Saccarosio, sorbitolo, metile p-idrossibenzoato,
aroma limone, acqua demineralizzata.**INDICAZIONI**Stati di
d e f e d a m e n t o e
convalescenza.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**persen
sibilita' ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Generalmente controindicato in gravidanza e
nell'allattamento.**POSOLOGIA**Il prodotto va assunto per via

orale, come tale o diluito in poca acqua. **Adulti:** 3 flaconcini al di'; **Bambini:** fino a 6 anni, un flaconcino al di'; sopra i 6 anni, due flaconcini al di'. Non superare le dosi consigliate.**CONSERVAZIONE**Nessuna.**AVVERTENZE**La soluzione orale contiene saccarosio e sorbitolo. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, da malassorbimento di glucosio-galattosio, o da insufficienza di sucralasi isomaltasi, non devono assumere questo medicinale. Il prodotto contiene saccarosio nelle quantita' indicate, di cio' si tenga conto in caso di diabete o di diete ipocaloriche. Inoltre il saccarosio puo' essere dannoso per i denti. Per la presenza di metile p-idrossibenzoato si possono verificare reazioni allergiche (anche ritardate).**INTERAZIONI**Non note.**EFFETTI INDESIDERATI**Non sono stati segnalati effetti collaterali riferibili all'uso del prodotto.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**In gravidanza e nell'allattamento la sicurezza del farmaco non e' dimostrata; pertanto il prodotto va somministrato nei casi di assoluta necessita' quando, i potenziali benefici superano i rischi possibili.