

## NEOXENE\*10 ovuli vag 10 mg

**Marchio:** NEOXENE  
**Codice Min.:** 032266052  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE**NEOXENE 10 MG OVULI **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Antimicrobici ed antisettici ginecologici. **PRINCIPI ATTIVI** Ogni ovulo contiene: principio attivo: CLOREXIDINA DIGLUCONATO mg 10. **Eccipienti:** propileparaidrossibenzoato, Etileparaidrossibenzoato. **Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1** **ECCIPIENTI** Glicerina, gelatina, propile paraidrossibenzoato, etile paraidrossibenzoato, blu Patent (E 131), acqua depurata. **INDICAZIONI** Disinfezione della mucosa vaginale. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli

eccipienti. **POSOLOGIA** Uno, massimo due ovuli al giorno per una durata massima di dieci giorni consecutivi. **NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE.** **CONSERVAZIONE** Non conservare a temperatura superiore a 25 gradi C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. **AVVERTENZE** Non usare per i trattamenti prolungati. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti puo' avere conseguenze gravi, talvolta fatali. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire un'idonea terapia. Neoxene e' per solo uso vaginale e non deve essere ingerito. Dopo l'applicazione di Neoxene e' consigliato lavarsi le mani, in caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con abbondante acqua. Questo medicinale contiene propileparaidrossibenzoato, etileparaidrossibenzoato come eccipienti pertanto puo' essere lievemente irritante per la cute, gli occhi e le mucose. Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini. **INTERAZIONI** Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti. **EFFETTI INDESIDERATI** E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. Nei confronti della clorexidina e' stato riportato qualche raro caso di idiosincrasia. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che siverificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Il medicinale va usato solo in caso di effettiva necessita', sotto il diretto controllo del medico.