

## NIDINA OPTIPRO 1 POLVERE 800 G

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 944777349  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Nestlé NIDINA OPTIPRO 1 Descrizione Latte per lattanti idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita quando essi non sono allattati al seno. Contiene DHA come prescritto dalla legge per tutte le formule per lattanti in conformità al Reg. UE 2016/127. Unicamente lattosio. Senza olio di palma. Dopo NESTLÉ NIDINA OPTIPRO 1, su indicazione del pediatra, si potrà passare ad un latte di proseguimento come NESTLÉ NIDINA OPTIPRO 2. Ingredienti Siero di latte parzialmente demineralizzato e frazionato in polvere, latte scremato, oli vegetali (girasole, colza), lattosio, 2'-fucosillattosio (2'-FL) (contiene lattosio), sali di calcio dell'acido citrico, citrato di potassio, olio di pesce, olio estratto da Mortierella alpina, cloruro di magnesio, idrossido di potassio; emulsionante: lecitine (di soia); cloruro di potassio, bitartrato di colina; correttore di acidità: acido

citrico; L-fenilalanina, sali di sodio dell'acido ortofosforico, cloruro di sodio, L-ascorbato di sodio, idrossido di calcio, Lactobacillus reuteri DSM17938\*, taurina, L-istidina, inositolo, solfato ferroso, solfato di zinco, 5'-monofosfato di citidina, acetato di DL-alfa-tocoferile, L-carnitina, 5'-monofosfato di uridina, nicotinamide, 5'-monofosfato di adenosina, D-pantotenato, calcio, 5'-monofosfato di guanosina, solfato rameico, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, riboflavina, cloridrato di piridossina, solfato di manganese, ioduro di potassio, acido folico, selenato di sodio, fillochinone, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina. \*Licenza di BioGaia AB Caratteristiche nutrizionali Valori mediper 100 gdi polvereper 100 mlal 12,9% p/v Energia2.172 kJ 519 kcal280 kJ 67 kcal Grassi di cui acidi grassi saturi27,6 g 2,5 g3,6 g 0,3 g Acido linoleico4.300 mg555 mg Acido alfa-linoleico380 mg49 mg Acido docosaesaenoico (DHA)130 mg16,8 mg Acido arachidonico (ARA)130 mg16,8 mg Carboidrati di cui zuccheri57,7 g 57,7 g7,4 g 7,4 g Lattosio57,7 g5,7 g Fibre0,7 g0,1 g 2'-fucosillattosio (HiMO)0,7 g0,1 g Proteine9,6 g1,2 g Vitamina A470 mcg-RE60,7 mcg-RE Vitamina D12 mcg1,5 mcg Tiamina620 mcg80 mcg Riboflavina1.500 mcg194 mcg Niacina4,3 mg0,55 mg Acido pantotenico4,3 mg0,55 mg Vitamina B6300 mcg39 mcg Biotina13 mcg1,7 mg Folato160 mcg-DFE20,6 mcg-DFE Vitamina B121,7 mcg0,22 mcg Vitamina C78 mg10 mg Vitamina K40 mcg5,2 mcg Vitamina E13 mg-TE1,7 mg-TE Sodio165 mg21 mg Potassio660 mg85,2 mg Cloruro390 mg50,3 mg Calcio330 mg42,6 mg Fosforo185 mg23,9 mg Magnesio44,0 mg5,67 mg Ferro2,4 mg0,31 mg Zinco3,7 mg0,48 mg Rame420 mcg54 mcg Iodio110 mcg14,2 mcg Selenio27 mcg3,5 mcg Manganese140 mcg18 mcg Fluoruro&#8804;60 mcg&#8804;7,7 mcg L-carnitina11 mg1,4 mg Taurina36 mg4,6 mg Colina175 mg23 mg Inositolo75 mg9,7 mg Nucleotidi16 mg2,1 mg Modalità d'uso Seguire le istruzioni attentamente. L'uso di acqua e biberon non bolliti, la ricostituzione, la conservazione, la manipolazione, la preparazione o la somministrazione non corrette potrebbero essere causa di rischi per la salute del lattante. Prima della preparazione lavarsi ed asciugarsi accuratamente le mani. Lavare con la massima cura biberon, tettarella e ghiera. Bollire per 5

minuti biberon, tettarella e ghiera precedentemente lavati e tenerli coperti fino al momento dell'uso. Bollire per 5 minuti acqua potabile e lasciarla intiepidire. Versare nel biberon la quantità esatta di acqua indicata nella Tabella di Alimentazione. Dosare la polvere con il misurino contenuto nella confezione. Aggiungere il numero di misurini rasi di polvere indicati nella Tabella di Alimentazione secondo l'età del lattante. Dopo l'uso, riporre il misurino nella parte superiore della confezione, appoggiandolo sul bordo interno. Chiudere il biberon, agitare fino a completa dissoluzione della polvere e somministrare subito. Chiudere accuratamente il barattolo.

| Tabella di alimentazione | Quantità per pasto | N° pasti al giorno | Età del lattante  | Acqua precedentemente bollita (ml)* | N° di misurini** | Biberon |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------|
| Altro                    | 1° e 2° settimana  | 9036-              | 3° e 4° settimana | 12045-                              | 2° mese          | 15055-  |
|                          | 3° e 4° mese       | 18065-             | 5° e 6° mese      | 21075-                              |                  |         |

\*Per mantenere in vita il maggior numero di fermenti lattici, l'acqua bollita deve essere raffreddata a temperatura idonea per il lattante prima di aggiungere la polvere \*\*Nota: usare esclusivamente il misurino all'interno della confezione. L'uso di quantità maggiori o minori di polvere rispetto a quelle indicate può essere causa di disidratazione o di ridotto apporto nutrizionale. Non cambiare le quantità indicate senza il parere medico

**Avvertenze** Preparare solamente un biberon alla volta. Preparare il latte solo al momento del pasto e consumarlo subito. Non conservare mai il latte avanzato nel biberon. Verificare sul dorso della mano la temperatura del latte prima di somministrarlo. Non lasciare mai il lattante da solo durante la poppata per evitare che soffochi. Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante e l'allattamento al seno dovrebbe durare più a lungo possibile. Prima di scegliere un latte per lattanti è necessario interpellare il pediatra.

**Conservazione** Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Validità a confezionamento integro: 18 mesi. Validità post-apertura: 3 settimane. Formato Barattolo da 800 g con misurino da 4,3 g

Cod. 12466594