

## NOVALAC 1 NEW FORMULA 800 G

**Marchio:** NOVALAC  
**Codice Min.:** 982011847  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**Novalac 1 LATTE PER LATTANTI IN POLVERE 0-6 mesi** Descrizione Novalac 1 è un alimento per lattanti idoneo sin dalla nascita nel caso in cui i lattanti non siano allattati al seno. E' un alimento che soddisfa le esigenze specifiche dei lattanti durante i primi 6 mesi di vita. Ingredienti Lattosio (latte); oli vegetali (palma, soia, cocco); maltodestrine; latte scremato; proteine del latte; olio di pesce (DHA) (supporto latte); Sali di potassio dell'acido ortofosferico; emulsionante (lecitina di soia); solfato di magnesio; citrato di potassio; cloruro di calcio; cloruro di sodio; cloruro di colina; vitamine vitamina C (L-ascorbato di sodio, acido L-ascorbido), acido pantotenico (D-pantotenato, calcio), niacina (nicotinamide), vitamine E (acetato di DL-alfa-tocoferile), tiamina (cloridrato di tiamina), vitamina A (acetato di retinile), riboflavina, vitamina B6 (cloridrato di

piridossina), folato (acido folico), vitamina K (fillochinone), D-biotina, vitamina D (colecalfiferolo), vitamina B12 (cianocobalamina); L-tirosina; inositolo; L-fenilalanina; Sali di calcio dell'acido citrico; olio estratto da Mortierella alpina (ARA) (supporto latte); Sali di calcio dell'acido ortofosforico; taurina; L-istidina; L-triptofano; solfato ferroso; L-carnitina; solfato di zinco; antiossidante: estratto ricco in tocoferolo; solfato rameico; solfato di manganese; ioduro di potassio. Caratteristiche nutrizionali Valori medi per 100 ml Energia 274 kJ/65 kcal Grassidi cui acidi grassi saturi acido linoleico (Omega 6) acido alfa-linoleico (Omega 3) DHA (acido docosaesaenoico) ARA (acido arachidonico) 3,3 g/1,5 g/0,6 g/53 mg/16 mg/4 mg Carboidrati di cui zuccheri 7,7 g/5,3 g Proteine 1,4 g Vitamina A 57 mcg Vitamina D 1,5 mcg Vitamina E 1,1 mg Vitamina K 7,8 mcg Vitamina C 7,8 mg Tiamina 0,10 mg Riboflavina 0,2 mg Niacina 0,6 mg Vitamina B6 0,07 mg Acido folico 10 mcg Folato 18 mcg-DFE Vitamina B12 0,2 mcg Biotina 2,3 mcg Acido pantotenico 0,7 mg Sodio 21 mg Potassio 68 mg Cloruro 52 mg Calcio 49 mg Fosforo 31 mg Magnesio 5,9 mg Ferro 0,5 mg Zinco 0,4 mg Rame 0,05 mg Manganese 0,006 mg Fluoruro Selenio 2,9 mcg Iodio 12 mcg Colina 22 mg Inositolo 10,4 mg Taurina 5,2 mg L-carnitina 2,6 mg Modalità d'uso Prima di preparare il biberon lavarsi sempre le mani. Pulire e sterilizzare il biberon, la tettarella e tutti i materiali che vengono utilizzati. Portare l'acqua ad ebollizione per 5 minuti e lasciar raffreddare fino a raggiungere una temperatura di 40 °C, oppure scaldare acqua oligominerale (da bottiglia appena aperta) fino a 40 °C. Versare nel biberon la quantità di acqua necessaria. Aggiungere la corretta quantità di Novelac polvere utilizzando il misurino incluso nella confezione. Livellare ogni misurino con un coltello asciutto e pulito senza pressare la polvere. Chiudere il biberon utilizzando il tappo di plastica dura e agitare fino a completa dissoluzione della polvere evitando la formazione di grumi. Rimuovere il tappo ed applicare la tettarella sterilizzata sul biberon. Fare raffreddare fino ad ottenere una temperatura di 37 °C. Controllare la temperatura del biberon mettendo una goccia del prodotto sul polso. Utilizzare immediatamente. Programma medio di alimentazione Età

(mesi) da 0 a 1 da 1 a 2 da 2 a 4 da 4 a 6 Pasti al giorno 6 5 5 4 Misurini per pasto 3 4 5 7  
Acqua bollita (ml) 90 120 150 210 \*come parte di una dieta diversificata. Ricostituzione (13%): 1  
misurino raso e non pressato (4.3 g) per ogni 30 ml d'acqua. Utilizzare solo il misurino fornito con il  
prodotto. Il numero dei pasti dovrebbe essere adattato all'appetito del bambino su consiglio del medico.  
Avvertenze Non utilizzare oltre la data indicata sotto il barattolo. Chiudere il barattolo dopo ogni uso con  
il coperchio di plastica. Non preparare il biberon in anticipo ma sempre appena prima del pasto. Ogni  
pasto va consumato entro un'ora dalla preparazione. Il prodotto non deve essere riutilizzato quando  
rimane nel biberon dopo la poppata. Gettare via la quantità rimasta. Non usare il biberon come  
ciuccio. Non aggiungere zucchero. Novalac contiene fenilalanina. Conservazione Conservare in luogo  
fresco e asciutto, lontano dalla luce e dalla contaminazioni a temperature non superiori a 25 °C. Validità  
a confezionamento integro: 24 mesi. Validità post-apertura: 3 settimane. Formato Confezione da 800 g  
Cod. 51B18B