

NOVALAC 3 800 G

Marchio: NOVALAC
Codice Min.: 983197649
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Novalac3 Descrizione Formula per bambini di età compresa fra 1 e 3 anni, come parte di una dieta varia e bilanciata ed un corretto stile di vita. Fonte di calcio, vitamina D, iodio e ferro: - Il calcio e la vitamina D sono necessari per la normale crescita e sviluppo delle ossa del bambino. - La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario nei bambini. - Lo iodio contribuisce alla normale crescita del bambino. - Il ferro contribuisce al normale sviluppo cognitivo del bambino. Può essere somministrato quotidianamente al bambino, caldo (

Ingredienti Latte parzialmente scremato, maltodestrine, lattosio (latte), oli vegetali (palma, soia, cocco, colza), fruttosio, destrosio, sali di calcio dell'acido citrico, sali di calcio dell'acido ortofosforico; vitamine: vitamina C (acido L-ascorbico), niacina (nicotinamide), vitamina E (acetato DL-alfa tocoferile), acido pantotenico (D-pantotenato, calcio), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (cloridrato di tiamina, vitamina A (acetato di retinile), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), acido folico, D-biotina, vitamina K (fitomenadione), vitamina D (colecalfiferolo), vitamina B12 (cianocobalamina), aroma, solfato ferroso, ossido di magnesio, solfato di zinco; antiossidante: estratto ricco in tocoferolo; solfato rameico, ioduro di potassio, solfato di manganese. Caratteristiche nutrizionali Valori medi per 100 ml %VNR* Energia 269 kJ/64 kcal Grassi di cui saturi acido linoleico (omega 6) acido alfa-linoleico (omega 3) 2,6 g 1 g 0,6 g 72 mg Carboidrati di cui zuccheri 8,7 mg 5,2 mg Proteina 1,5 g Sale 0,04 g VITAMINE A 73 mcg 18 B1 0,08 mg 16 B2 0,14 mg 20 B12 0,3 mcg 38 C 8,1 mg 18 D 1,1 mcg 16 Acido folico 16 mcg 21 K 4,1 mcg 34 Biotina 2,7 mcg 27 MINERALI Calcio 88 mg 16 Ferro 1,3 mg 16 Iodio 1,4 mcg 18 *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento. Modalità d'uso Prima di preparare il biberon lavarsi sempre le mani. 1. Pulire e sterilizzare ogni materiale che viene utilizzato. 2. Portare l'acqua a ebollizione per 5 minuti e lasciare raffreddare fino a raggiungere una temperatura di 40°C, oppure scaldare acqua oligominerale (da bottiglia appena aperta) fino a 40°C. 3. Versare nel biberon o nella tazza la quantità di acqua necessaria. 4. Aggiungere la corretta quantità di novalac polvere utilizzando il misurino incluso nella confezione. Livellare ogni misurino con un coltello asciutto e pulito senza pressare la polvere. 5. Agitare o mescolare fino a completa dissoluzione della polvere, evitando la formazione di grumi. 6. Fare raffreddare fino ad ottenere una temperatura di 37°C. controllare la temperatura del biberon mettendo una goccia del prodotto sul polso. Utilizzare immediatamente. Ricostituzione (13,5%): 1 misurino raso e non pressato (4,5 g) per ogni 30 ml di acqua. Nel biberon o in una tazza: 8 misurini in 240 ml di acqua. Una confezione da 800 g consente di preparare circa 22 porzioni (una porzione=240 ml di acqua+8 misurini). Avvertenze - Non utilizzare oltre la data indicata sotto il barattolo. - Dopo l'apertura utilizzare il prodotto entro tre settimane. - Rimuovere completamente il foglio metallico alla prima apertura. - Chiudere il barattolo dopo ogni uso con il coperchio di plastica. - Non preparare il

biberon o la tazza in anticipo, ma sempre appena prima del pasto. - Ogni pasto va consumato entro un'ora dalla preparazione. - Il prodotto non deve essere riutilizzato quando rimane nel biberon dopo la poppata. Gettare via la quantità rimasta. - Non aggiungere zucchero. - Non usare il biberon come ciuccio. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce e dalle contaminazioni. Validità a confezionamento integro: 24 mesi. Validità post-apertura: 21 giorni. Formato Confezione da 300 g. Cod. 51B20D