

## NOVALAC ALLERNOVA PRO 400 G

**Marchio:** NOVALAC  
**Codice Min.:** 981069572  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Novalac Allernova PRO Descrizione Alimento a fini medici speciali in polvere, completo da un punto di vista nutrizionale in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali dei bambini da 0 a 36 mesi di età in caso di allergia alle proteine del latte vaccino. NOVALAC Allernova PRO contiene proteine idrolizzate (idrolizzato di caseina) per una migliore digeribilità e una migliore tollerabilità. NOVALAC Allernova PRO contiene una miscela unica di addensanti, brevettata, che combina le qualità dell'amido e delle fibre alimentari. Ingredienti Maltodestrine, oli vegetali (palma, colza, girasole, cocco), proteine del latte idrolizzate, addensanti (pectina, farina di semi di carrube), amido di tapioca, sali di calcio dell'acido ortofosforico (tricalcium fosfato), emulsionante (lecitina di girasole), cloruro di calcio, cloruro di magnesio, sali di calcio dell'acido citrico, bitartrato di

colina, acido docosaesaenoico (DHA), L-cisteina, sali di calcio dell'acido ortofosforico (monocalcio fosfato); vitamine: vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina E (acetato di DL-alfa tocoferile), acido pantotenico (D-pantotenato, calcio), niacina (nicotinamide), riboflavina, tiamina (cloridrato di tiamina), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina A (acetato di retinile), folato (acido folico), vitamina K (fillochinone), D-biotina, vitamina D (colecalfiferolo) vitamina B12 (cianocobalamina); citrato di sodio, sali di potassio dell'acido ortofosforico, L-triptofano, difosfato ferrico, acido arachidonico (ARA), taurina, L-istidina, inositolo, L-fenilalanina, L-carnitina, L-tirosina, L-isoleucina, citrato di potassio, solfato di zinco; antiossidanti: estratto ricco in tocoferolo, palmitato di ascorbile; selenito di sodio, solfato rameico, ioduro di potassio, solfato di manganese. Senza glutine. Senza lattosio. Caratteristiche nutrizionali Valori mediper 100 ml Energia281 kJ 67 kcal Grassi di cui saturi - Ac. linoleico (omega 6) - Ac. alfa-linoleico (omega 3) - DHA (acido docosaesaenoico) - ARA (acido arachidonico)3,5 g 1,4 g 0,6 g 58 mg 16 mg 4 mg Carboidrati di cui zuccheri di cui amido7 g 0,2 g 0,1 g Fibra0,5 g \*Proteine1,6 g Sale0,06 g Vitamina A59 mcg Vitamina D1,6 mcg Vitamina E1,2 mg Vitamina K4,1 mcg Vitamina C8,1 mg Tiamina0,11 mg Riboflavina0,2 mg Niacina0,6 mg Vitamina B60,08 mg Acido folico11 mcg Folato18 mcg-DFE Vitamina B120,2 mcg Biotina2 mcg Acido pantotenico0,7 mg Sodio22 mg Potassio84 mg Cloruro54 mg Calcio81 mg Fosforo45 mg Magnesio6,8 mg Ferro1,1 mg Zinco0,5 mg Rame0,05 mg Manganese0,007 mg Fluoruro&#60;0,06 mg Selenio3 mcg Cromo&#60;6,1 mcg Molibdeno&#60;6,1 mcg Iodio14 mcg Colina23 mg Inositolo3,4 mg Taurina5,4 mg L-carnitina2,7 mg \*Le proteine contenute in NOVALAC Allernova PRO sono proteine idrolizzate del latte vaccino. Modalità d'uso Prima di preparare il biberon, lavarsi sempre le mani. Pulire e sterilizzare il biberon, la tettarella e tutti i materiali che vengono utilizzati. Portare l'acqua ad ebollizione per 5 minuti e lasciare raffreddare fino a raggiungere una temperatura di 40°C, oppure scaldare acqua oligominerale (da bottiglia appena aperta) fino a 40°C. Versare nel biberon la quantità di acqua necessaria. Aggiungere la corretta quantità di

Novalac polvere utilizzando il misurino incluso nella confezione. Livellare ogni misurino con un coltello asciutto e pulito senza pressare la polvere. Chiudere il biberon utilizzando il tappo di plastica dura e agitare fino a completa dissoluzione della polvere evitando la formazione di grumi. Rimuovere il tappo ed applicare la tettarella sterilizzata sul biberon. Fare raffreddare fino ad ottenere una temperatura di 37°C. Controllare la temperatura del biberon mettendo una goccia del prodotto sul polso. Utilizzare immediatamente. Ricostituzione (13,5%): 1 misurino raso e non pressato (4,5 g) per ogni 30 ml di acqua. Utilizzare solo il misurino fornito con il prodotto. Il numero dei pasti dovrebbe essere adattato all'appetito del lattante su consiglio del medico. PROGRAMMA MEDIO DI ALIMENTAZIONE Età da 0 a 1 mesida 1 a 2 mesida 2 a 4 mesida 4 a 6 mesida 6 a 12 mesida 12 a 36 mesi Pasti al giorno 65543\*\*2 a 3\*\* Misurini per pasto 345778 Acqua bollita 90 ml 120 ml 150 ml 210 ml 210 ml 240 ml \*\*come parte di una dieta diversificata. Avvertenze Il latte materno è il miglior alimento per i lattanti. Qualora non fosse possibile utilizzare o non fosse sufficiente il latte materno, può essere utilizzato un latte per lattanti soltanto dietro parere del medico. L'inadeguata preparazione e conservazione di qualsiasi latte per lattanti potrebbe causare pericoli per la salute. Utilizzare esclusivamente sotto controllo medico e solo in bambini che presentano i sintomi per cui è destinato il prodotto. NOVALAC Allernova PRO può essere utilizzato come unica fonte di alimentazione fino ai sei mesi di vita del bambino se non è possibile l'allattamento al seno. Dopo il sesto mese, su consiglio del medico, NOVALAC Allernova PRO si integrerà in un'alimentazione diversificata. È indispensabile tuttavia seguire attentamente le raccomandazioni del medico riguardo alla diversificazione alimentare. Si raccomanda, in particolare, di ritardare l'introduzione di alimenti potenzialmente allergizzanti come uova, pesce o carne. Non introdurre, senza parere medico, prodotti contenenti proteine del latte nell'alimentazione del bambino (farine di cereali con latte, latticini...). NOVALAC Allernova PRO non deve essere assunto in caso di malassorbimento di glucosio-galattosio. NOVALAC Allernova PRO contiene fenilalanina. Non utilizzare oltre la data indicata sotto la confezione. Chiudere il barattolo dopo ogni uso con il coperchio di plastica. Non preparare il biberon in anticipo ma sempre appena prima del pasto. Ogni pasto va consumato entro un'ora dalla preparazione. Il prodotto non deve essere riutilizzato quando rimane nel biberon dopo la poppata. Gettare via la quantità rimasta. Data la sua composizione particolare, NOVALAC Allernova PRO ha un aspetto, un odore e un gusto tipici, diversi da quelli delle formule classiche per la prima infanzia. NOVALAC Allernova PRO può naturalmente contenere degli aggregati più chiari costituiti da fibre alimentari che non pregiudicano la qualità del prodotto. Il consumo di questo prodotto può causare la comparsa di feci di colore più verde e meno dure rispetto ad una formula classica, ma senza causare discomfort per il neonato. Non usare il biberon come ciuccio. Non aggiungere zucchero. Il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale. Conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce e dalle contaminazioni. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Validità post-apertura: 3 settimane. Formato Barattolo da 400 g. Cod. 51B16C