

NOVALAC ANTI RIGURGITO 800 G

Marchio: NOVALAC
Codice Min.: 982011835
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Novalac Anti Regurgito 0-36 mesi Descrizione Novalac Anti Rigurgito è un alimento a fini medici speciali in polvere contenente amido, indicato per soddisfare le esigenze nutrizionali dei bambini da 0 a 36 mesi in caso di rigurgito. Novalac può costituire l'unica fonte di nutrimento nei lattanti da 0 a 6 mesi, se non è possibile l'allattamento al seno. Successivamente, e su consiglio del medico, Novalac Anti Rigurgito si integrerà nell'alimentazione diversificata del bambino. Ingredienti Latte scremato; lattosio (latte; oli vegetali (palma, soia, cocco); amido di mais, olio di pesce (DHA) (supporto latte); bitartrato di colina; emulsionante (lecitina di soia); sali di calcio dell'amido citrico; vitamine: vitamina C (L-ascorbato di sodio), vitamina E (acetato di DL-alfa tocoferile), acido pantotenico (D-pantotenato, calcio), niacina (nicotinamide), vitamina C (acido L-

ascorbico), tiamina (cloridrato di tiamina), riboflavina, vitamina A (acetato di retinile), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), folato (acido folico), vitamina K (fitomenadione), vitamina D (colecalfiferolo), D-biotina, vitamina B12 (cianocobalamina); inositolo; L- cistina; cloruro di calcio; L-triptofano; cloruro di potassio; olio estratto da Mortierella alpina (ARA) (supporto latte); sali di calcio dell'acido ortofosforico; cloruro di sodio; taurina; sali di sodio dell'acido ortofosforico; solfato ferroso; L-carnitina; ossido di magnesio; solfato di zinco, citrato di potassio; antiossidante: estratto ricco di tocoferolo; selenito di sodio; solfato rameico; ioduro di potassio; solfato di manganese. Caratteristiche nutrizionali Valori medi per 100 ml Energia 275 kJ/66 kcal Grassidi cui acidi grassi saturiacido linoleicoacido alfa-linoleicoDHA (acido docosaesaenoico)ARA (acido arachidonico) 3,3 g/1,5 g 0,6 g/53 mg/16 mg/4 mg Carboidratidi cui zuccheridi cui amido 7,7 g/5,6 g/2 g Proteine* 1,4 g Sale 0,05 g Vitamina A 57 mcg Vitamina D 1,5 mcg Vitamina E 1,1 mg Vitamina K 7,8 mcg Vitamina C 8,5 mg Tiamina 104 mcg Riboflavina 156 mcg Niacina 0,6 mg Vitamina B6 65 mcg Acido folico 11 mcg Folato 20 mcg-DFE Vitamina B12 0,2 mcg Biotina 2,3 mcg Acido pantotenico 0,7 mg Sodio 21 mg Potassio 75 mg Cloruro 50 mg Calcio 60 mg Fosforo 44 mg Magnesio 509 mg Ferro 0,7 mg Zinco 0,5 mg Rame 49 mcg Manganese 5 mcg Fluoruro Selenio 2,9 mcg Cromo Molibdeno Iodio 12 mcg Colina 22 mg Inositolo 10,4 mg Taurina 5,2 mg L-carnitina 2,6 mg *Proteine da latte vaccino. Modalità d'uso Prima di preparare il biberon lavarsi sempre le mani.Pulire e sterilizzare il biberon, la tettarella e tutti i materiali che vengono utilizzati.Portare l'acqua ad ebollizione per 5 minuti e lasciar raffreddare fino a raggiungere una temperatura di 40 °C, oppure scaldare acqua oligominerale (da bottiglia appena aperta) fino a 40 °C.Versare nel biberon la quantità di acqua necessaria. Aggiungere la corretta quantità di Novelac polvere utilizzando il misurino incluso nella confezione. Livellare ogni misurino con un coltello asciutto e pulito senza pressare la polvere.Chiudere il biberon utilizzando il tappo di plastica dura e agitare fino a completa dissoluzione della polvere evitando la formazione di grumi. Rimuovere il tappo

ed applicare la tettarella sterilizzata sul biberon. Fare raffreddare fino ad ottenere una temperatura di 37 °C. Controllare la temperatura del biberon mettendo una goccia del prodotto sul polso. Utilizzare immediatamente. Programma medio di alimentazione: Età (mesi) da 0 a 1 da 1 a 2 da 2 a 4 da 4 a 6 da 6 a 12 da 12 a 36 Pasti al giorno 6 5 5 4 3* 2* Misurini per pasto 3 4 5 7 7 8 Acqua bollita (ml) 90 120 150 210 210 240 *come parte di una dieta diversificata. Ricostituzione (13%): 1 misurino raso e non pressato (4.3 g) per ogni 30 ml d'acqua. Utilizzare solo il misurino fornito con il prodotto. Il numero dei pasti dovrebbe essere adattato all'appetito del bambino su consiglio del medico. Avvertenze Non utilizzare oltre la data indicata sotto il barattolo. Rimuovere completamente il foglio metallico alla prima apertura. Chiudere il barattolo dopo ogni uso con il coperchio di plastica. Non preparare il biberon in anticipo ma sempre appena prima del pasto. Ogni pasto va consumato entro un'ora dalla preparazione. Il prodotto non deve essere riutilizzato quando rimane nel biberon dopo la poppata. Gettare via la quantità rimasta. Non usare il biberon come ciuccio. Non aggiungere zucchero. Il prodotto non è adatto all'alimentazione tramite sondino. Il prodotto non è adatto ad essere somministrato per via parenterale. Data la sua composizione particolare potrebbe essere necessario agitare Novelac Anti Rigurgito più del dovuto per ottenere una completa dissoluzione della polvere e comunque la polvere potrebbe assumere una diversa consistenza rispetto ad una formula standard. Per agevolare la poppata è consigliato utilizzare un'adeguata tettarella. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce e dalla contaminazioni a temperature non superiori a 25 °C. Validità a confezionamento integro: 24 mesi. Validità post-apertura: 3 settimane. Formato Confezione da 800 g Cod. 51B33C