

NOVALAC ANTISTIPSI 0-36 MESI 800 G

Marchio: NOVALAC
Codice Min.: 982011823
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Novalac Anti Stipsi 0-36 mesi Descrizione Novalac Anti Stipsi è un alimento a fini medici speciali in polvere indicato per soddisfare le esigenze nutrizionali dei bambini da 0 a 36 mesi in caso di costipazione, rallentato transito intestinale e feci dure. Novalac Anti Stipsi ha una specifica composizione in minerali e carboidrati (unicamente lattosio) in grado di regolare il transito intestinale aumentando il contenuto di acqua nelle feci, ammorbidendole e stimolando il transito intestinale. Novalac Anti Stipsi può costituire l'unica fonte di nutrimento nei lattanti da 0 a 6 mesi, se non è possibile l'allattamento al seno. Successivamente, e su consiglio del medico, Novalac Anti Rigurgito si integrerà nell'alimentazione diversificata del bambino. **Ingredienti** Latte scremato; proteine del latte; oli vegetali (palma, soia, cocco); lattosio (latte), sali di calcio

dell'acido citrico; olio di pesce (DHA) (supporto latte), citrato di potassio; emulsionante (lecitina di soia); cloruro di calcio; cloruro di potassio; sali di calcio dell'acido ortofosforico; bitartrato di colina; sali di sodio dell'acido ortofosforico; L-tirosina; vitamine: vitamina C (L-ascorbato di sodio), vitamina E (acetato di DL-alfa tocoferile), acido pantotenico (D-pantotenato, calcio), niacina (nicotinamide), tiamina (cloridrato di tiamina), vitamina A (acetato di retinile), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), riboflavina, vitamina C (acido L-ascorbico), folato (acido folico), vitamina K (fillochinone), vitamina D (colecalfiferolo), D-biotina, vitamina B12 (cianocobalamina); L-fenilalanina; cloruro di sodio; ossido di magnesio; inositolo; olio estratto da *Mortierella alpina* (ARA) (supporto latte), taurina; L- triptofano; solfato ferroso; L-carnitina; solfato di zinco; selenito di sodio; antiossidante: estratto ricco di tocoferolo; solfato rameico; ioduro di potassio; solfato di manganese. **Caratteristiche nutrizionali** Valori medi per 100 ml Energia 276 kJ66 kcal Grassidi cui acidi grassi saturiacido linoleicoacido alfa-linoleicoDHA (acido docosaesaenoico)ARA (acido arachidonico) 3,3 g1,5 g 0,6 g53 mg16 mg4 mg Carboidratidi cui zuccheri 7,7 g7,7 g Proteine* 1,4 g Sale 0,06 g Vitamina A 57 mcg Vitamina D 1,6 mcg Vitamina E 1,1 mg Vitamina K 7,8 mcg Vitamina C 7,8 mg Tiamina 104 mcg Riboflavina 169 mcg Niacina 0,6 mg Vitamina B6 65 mcg Acido folico 10 mcg Folato 18 mcg-DFE Vitamina B12 0,2 mcg Biotina 2,3 mcg Acido pantotenico 0,7 mg Sodio 23 mg Potassio 70 mg Cloruro 51 mg Calcio 67 mg Fosforo 35 mg Magnesio 8,5 mg Ferro 10,7 mg Zinco 0,5 mg Rame 51 mcg Manganese 6 mcg Fluoruro Selenio 3,4 mcg Cromo Molibdeno Iodio 12 mcg Colina 22 mg Inositolo 10,4 mg Taurina 5,2 mg L-carnitina 2,6 mg *Proteine da latte vaccino. **Modalità d'uso** Prima di preparare il biberon lavarsi sempre le mani.Pulire e sterilizzare il biberon, la tettarella e tutti i materiali che vengono utilizzati.Portare l'acqua ad ebollizione per 5 minuti e lasciar raffreddare fino a raggiungere una temperatura di 40 °C, oppure scaldare acqua oligominerale (da bottiglia appena aperta) fino a 40 °C.Versare nel biberon la quantità di acqua necessaria. Aggiungere la corretta quantità di Novelac polvere utilizzando il misurino incluso nella

confezione. Livellare ogni misurino con un coltello asciutto e pulito senza pressare la polvere. Chiudere il biberon utilizzando il tappo di plastica dura e agitare fino a completa dissoluzione della polvere evitando la formazione di grumi. Rimuovere il tappo ed applicare la tettarella sterilizzata sul biberon. Fare raffreddare fino ad ottenere una temperatura di 37 °C. Controllare la temperatura del biberon mettendo una goccia del prodotto sul polso. Utilizzare immediatamente. Programma medio di alimentazione: Età (mesi) da 0 a 1 da 1 a 2 da 2 a 4 da 4 a 6 da 6 a 12 da 12 a 36 Pasti al giorno 6 5 5 4 3* 2* Misurini per pasto 3 4 5 7 7 8 Acqua bollita (ml) 90 120 150 210 210 240 *come parte di una dieta diversificata. Ricostituzione (13%): 1 misurino raso e non pressato (4.3 g) per ogni 30 ml d'acqua. Utilizzare solo il misurino fornito con il prodotto. Il numero dei pasti dovrebbe essere adattato all'appetito del bambino su consiglio del medico. In seguito all'approvazione del medico, si consiglia di introdurre Novelac Anti Stipsi progressivamente, secondo le seguenti indicazioni:- 1° giorno: ad ogni secondi biberon;- 2° giorno: ad ogni biberon. Avvertenze Non utilizzare oltre la data indicata sotto il barattolo. Rimuovere completamente il foglio metallico alla prima apertura. Chiudere il barattolo dopo ogni uso con il coperchio di plastica. Non preparare il biberon in anticipo ma sempre appena prima del pasto. Ogni pasto va consumato entro un'ora dalla preparazione. Il prodotto non deve essere riutilizzato quando rimane nel biberon dopo la poppata. Gettare via la quantità rimasta. Non usare il biberon come ciuccio. Non aggiungere zucchero. Il prodotto non è adatto all'alimentazione tramite sondino. Il prodotto non è adatto ad essere somministrato per via parenterale. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce e dalla contaminazioni a temperature non superiori a 25 °C. Validità a confezionamento integro: 24 mesi. Validità post-apertura: 3 settimane. Formato Confezione da 800 g Cod. 551B39B