

NOVALAC REFLUX PRO 800 G

Marchio: NOVALAC
Codice Min.: 981491400
Link: [clicca qui per acquistare](#)



NOVALAC REFLUX PRO 0 - 36 mesi Descrizione Alimento a fini medici speciali in polvere, con una formula addensata specificatamente studiata per soddisfare le esigenze nutrizionali dei bambini da 0 a 36 mesi in caso di reflusso gastroesofageo. Novalac Reflux PRO contiene un'esclusiva miscela di addensanti che combina le qualità dell'amido e delle fibre alimentari e che permette di minimizzare i rigurgiti. La fonte delle proteine di Novalac Reflux PRO è da proteine del latte vaccino. In caso di allergie, nascita prematura, basso peso alla nascita o immunodeficienza, chiedere consiglio al medico. **IMPORTANTE:** Novalac Reflux PRO può costituire l'unica fonte di alimentazione del bambino fino all'età di 6 mesi se non è possibile l'allattamento al seno. Successivamente, e su consiglio del medico Novalac

Reflux PRO si integrerà nell'alimentazione diversificata del bambino. Novalac Reflux PRO deve essere usato sotto controllo medico e solo nei lattanti che presentano i sintomi per i quali il prodotto è indicato. La formula non deve essere modificata senza consultare il medico. Il latte materno è il miglior alimento per i lattanti. Qualora non fosse possibile utilizzare o non fosse sufficiente il latte materno, può essere utilizzato un latte per lattanti soltanto dietro parere medico. L'inadeguata preparazione e conservazione di qualsiasi latte per lattanti potrebbe causare pericoli per la salute. **Ingredienti** Latte scremato; maltodestrine; oli vegetali (palma, soia, cocco); lattosio (latte); addensanti (pectina, farina di semi di carrube); amido di tapioca; olio di pesce (DHA) (supporto latte); emulsionante (lecitina di soia); bitartrato di colina; cloruro di calcio; sali di calcio dell'acido citrico; vitamine: vitamina C (ascorbato di sodio, acido L-ascorbico), vitamina E (acetato di DL-alfa tocoferile), acido pantotenico (D-pantotenato, calcio), niacina (nicotinamide), tiamina (cloridrato di tiamina), riboflavina, vitamina A (acetato di retinile), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), folato (acido folico), vitamina K (fitomenadione), vitamina D (colecalfiferolo), D-biotina, vitamina B12 (cianocobalamina); L-cistina; inositolo; L-triptofano; cloruro di potassio; olio estratto da *Mortierella alpina* (ARA) (supporto latte); sali di calcio dell'acido ortofosforico (tricalcium fosfato); taurina; sali di sodio dell'acido ortofosforico; solfato ferroso; cloruro di sodio; L-carnitina; ossido di magnesio; solfato di zinco; antiossidante: estratto ricco in tocoferoli; selenito di sodio; solfato rameico; ioduro di potassio; solfato di manganese. **Caratteristiche nutrizionali** Valori medi per 100 ml Energia 271 kJ 65 kcal Grassi di cui: saturi acido linoleico acido alfa-linolenico DHA (acido docosaesaenoico) ARA (acido arachidonico) 3,3 g 1,5 g 0,6 g 53 mg 16 mg 4 mg Carboidrati di cui: zuccheri amido 7,3 g 3,3 g 0,1 g Fibre 0,5 g Proteine* 1,4 g Sale 0,06 g Vitamina A 57 mcg Vitamina D 1,5 mcg Vitamina E 1,1 mg Vitamina K 7,8 mcg Vitamina C 8,5 mg Tiamina 0,10 mg Riboflavina 0,2 mg Niacina 0,6 mg Vitamina B6 0,07 mg Acido folico 11 mcg Folato 20 mcg/DFE Vitamina B12 0,2 mcg Biotina 2,3 mcg Acido pantotenico 0,6 mg Sodio 25 mg Potassio 77 mg Cloruro 58 mg Calcio 68 mg

Fosforo 44 mg Magnesio 5,9 mg Ferro 0,7 mg Zinco 0,5 mg Rame 0,05 mg Manganese 0,005 mg Fluoruro Selenio 2,9 mcg Cromo Molibdeno Iodio 12 mcg Colina 22 mg Inositolo 10,4 mg Taurina 5,2 mg L-carnitina 2,6 mg *Proteine da latte vaccino

Modalità d'uso Prima di preparare il biberon lavarsi sempre le mani. 1. Pulire e sterilizzare il biberon, la tettarella e tutti i materiali che vengono utilizzati. 2. Portare l'acqua ad ebollizione per 5 minuti e lasciare raffreddare fino a raggiungere una temperatura di 40°C, oppure scaldare acqua oligominerale (da bottiglia appena aperta) fino a 40°C. 3. Versare nel biberon la quantità di acqua necessaria. 4. Aggiungere la corretta quantità di Novalac polvere utilizzando il misurino incluso nella confezione. Livellare ogni misurino con un coltello asciutto e pulito senza pressare la polvere. 5. Chiudere il biberon utilizzando il tappo di plastica dura e agitare fino a completa dissoluzione della polvere evitando la formazione di grumi. Rimuovere il tappo ed applicare la tettarella sterilizzata sul biberon. 6. Fare raffreddare fino ad ottenere una temperatura di 37°C. Controllare la temperatura del biberon mettendo una goccia del prodotto sul polso. Utilizzare immediatamente.

Programma medio di alimentazione Età (mesi) da 0 a 1 da 1 a 2 da 2 a 4 da 4 a 6 da 6 a 12 da 12 a 36
Pasti al giorno 6 5 5 4 3* 2* Misurini per pasto 3 4 5 7 7 8 Acqua bollita (ml) 90 120 150 210 210 240

*come parte di una dieta diversificata Ricostituzione (13%): 1 misurino raso e non pressato (4,3 g) per ogni 30 ml di acqua. Utilizzare solo il misurino fornito con il prodotto. Il numero dei pasti dovrebbe essere adattato all'appetito del lattante su consiglio del medico. Avvertenze Non preparare il biberon in anticipo ma sempre appena prima del pasto. Ogni pasto va consumato entro un'ora dalla preparazione. Il prodotto non deve essere riutilizzato quando rimane nel biberon dopo la poppata. Gettare via la quantità rimasta. Data la sua particolare composizione, in fase di preparazione, potrebbe essere necessario agitare di più il biberon rispetto alla preparazione di una formula classica, per ottenere la completa dissoluzione di Novalac Reflux PRO. L'aspetto di Novalac Reflux PRO nel biberon può essere diverso da quello di una formula classica e potrebbe essere necessario l'utilizzo di una tettarella specifica. La formula addensata di Novalac Reflux PRO potrebbe naturalmente presentare piccole particelle scure di origine vegetale (farina di semi di carrube) e/o alcuni agglomerati bianchi di fibre alimentari. Ciò non causa discomfort nel bambino. Non usare il biberon come ciuccio. Non aggiungere zucchero. Il prodotto non è adatto all'alimentazione per via parenterale o enterale. Conservazione Non utilizzare oltre la data indicata sotto il barattolo. Validità a confezionamento integro: 24 mesi. Dopo l'apertura usare il prodotto entro 3 settimane. Chiudere il barattolo dopo ogni uso con il coperchio di plastica. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce e dalle contaminazioni. Confezionato in atmosfera protettiva. Il barattolo, il coperchio ed il misurino di Novalac Reflux PRO possono essere riciclati. Smaltirli in modo appropriato. Formato Barattolo da 800 g Cod. 51B26B