

NTR*gtt rinol 15 ml

Marchio: Teofarma
Codice Min.: 027077015
Link: [clicca qui per acquistare](#)



D E N O M I N A Z I O N E N T R C A T E G O R I A
FARMACOTERAPEUTICA Decongestionanti nasali ed altre preparazioni per uso topico. **PRINCIPI ATTIVI** Un ml contiene: fenilefrina cloridrato 5,000 mg, tenildiamina cloridrato 1,000 mg, benzalconio cloruro 0,200 mg. **ECCIPIENTI** Soluzione acquosa tamponata costituita da: sodio citrato 2H₂O; sodio cloruro; 2-fenossietanolo; acido citrico; acqua depurata. **INDICAZIONI** Per alleviare l'eccessiva secrezione dovuta al raffreddore. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' ai principi attivi, o ad uno qualsiasi degli eccipienti; malattie cardiache ed ipertensione arteriosa gravi; glaucoma, ipertiroidismo. Non impiegare il prodotto nei bambini sotto i 12 anni. Non somministrare durante e nelle due settimane successive a

terapia con farmaci antidepressivi. Non somministrare durante la gravidanza e l'allattamento. **POSOLOGIA** Uso per nebulizzatore: per maggior convenienza o per un piu' facile uso il prodotto e' contenuto in un nebulizzatore di plastica adatto all'uso endonasale. Per il massimo di efficacia, occorre premere il dosatore durante una inspirazione, dopo essersi soffiato il naso. La prima insufflazione riduce il gonfiore nelle parti inferiori del naso. Ripetendo l'operazione a pochi minuti di intervallo si decongestionano le mucose piu' profonde in modo da aprire i seni nasali. Ripetere ogni 3 -4 ore, se necessario. **Uso del flacone contagocce:** Instillare 2 - 3 gocce di soluzione in ognuna delle narici, dopo essersi soffiato il naso, ed assicurandosi della penetrazione profonda del prodotto, eventualmente ripetendo l'operazione dopo una decina di minuti. In ogni caso il trattamento non deve essere protratto per oltre quattro giorni. **CONSERVAZIONE** Il flacone va conservato ben chiuso e al riparo della luce in quanto la prolungata esposizione all'aria, ai metalli o alla luce intensa provoca ossidazione ed una certa perdita di potenza. Soluzioni con colore alterato, sebbene innocue, debbono quindi essere gettate via. Conservare a temperatura non superiore a 25 gradi C. **AVVERTENZE** Impiegare con cautela e a giudizio del medico per il pericolo di ritenzione urinaria, negli anziani e nei portatori di ipertrofia prostatica. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti topici puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione e causare effetti indesiderati; in tal caso e' necessario interrompere il trattamento e, se del caso, istituire una terapia idonea. Nei pazienti con malattie cardiovascolari e specialmente negli ipertesi l'uso dei decongestionanti nasali deve essere comunque di volta in volta sottoposto al giudizio del medico. L'uso protratto di vasocostrittori puo' alterare la normale funzione della mucosa del naso e dei seni paranasali inducendo anche assuefazione al farmaco. Il ripetere le applicazioni per un lungo periodo di tempo puo' risultare dannoso. Si raccomanda di non associare altri vasocostrittori come decongestionanti nasali, per via orale o nasale, per il rischio di vasocostrizione. I bambini sono piu' sensibili agli effetti sistemici dei vasocostrittori simpaticomimetici, pertanto il prodotto va tenuto lontano dalla loro portata poiche'

l'ingestione accidentale può provocare grave depressione del sistema nervoso centrale con sedazione spiccata. Benzalconio cloruro (BAC) contenuto come principio attivo in NTR, specie quando usato per lunghi periodi, può provocare un rigonfiamento della mucosa nasale. Se si sospetta tale reazione (naso continuamente congestionato), dovrebbe essere usato, se possibile, un altro medicinale per uso nasale senza BAC. Se tale medicinale per uso nasale senza BAC non fosse disponibile, dovrà essere considerata un'altra forma farmaceutica. Può causare broncospasmo. Nebulizzatore: se il flacone è nuovo premere due-tre volte il dosatore senza introdurre nell'aranci. Flacone contagocce: per aprire il flacone è necessario premere e contemporaneamente svitare. Si consiglia di appoggiare il flacone su una base; per chiudere il flacone avvitare normalmente; per utilizzi successivi, ripetere il procedimento. Il contenitore è costituito da gomma latex. Può causare gravi reazioni allergiche. INTERAZIONI Con farmaci antiipertensivi può verificarsi un potenziamento dell'effetto della fenilefrina. EFFETTI INDESIDERATI Il prodotto può determinare localmente fenomeni di sensibilizzazione e congestione delle mucose di rimbalzo. Per rapido assorbimento della fenilefrina attraverso le mucose infiammate, si possono verificare effetti sistemici consistenti in ipertensione arteriosa, bradicardia riflessa, cefalea, disturbi della minzione. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Non utilizzare durante il periodo di gravidanza ed allattamento.