

ORALIFE GEL CAVITA' ORALE 30 ML

Marchio:

-

Codice Min.:

930250283

Link:

[clicca qui per acquistare](#)



OraLife Gel Descrizione OraLife Gel è indicato per il trattamento della sintomatologia associata all'infiammazione e irritazione delle mucose orali arrossate, dolenti, gonfie e/o secche, come in caso di conseguenze da mucositi, anche in soggetti sottoposti a radioterapia, stress termico o chimico. Contiene acidi grassi (F.A.G.) e acido ialuronico che favoriscono il processo rigenerativo della mucosa orale. OraLife Gel fornisce inoltre un supporto coadiuvante in fase post-infettiva e nel periodo post-operatorio. Modalità d'uso Durante la radioterapia, applicare il gel sulla mucosa orale almeno 4 ore prima dell'esposizione, distribuendolo con la lingua e/o le dita con un leggero massaggio. Dopo l'esposizione, applicare il gel più volte al giorno, secondo necessità o secondo diverso parere del medico o del farmacista. Per altri usi, applicare OraLife Gel 3 o più volte al giorno, secondo necessità, sulla mucosa orale e

massaggiare delicatamente con la lingua e/o le dita. Il trattamento deve essere continuato fino al controllo dei sintomi. Non bere e non risciacquare il cavo orale, per almeno 30 minuti, dopo l'applicazione del gel. Componenti Aqua, Glycerin, PVP/Hexadecene Copolymer, Fructose, Ethylhexyl Stearate, Panthenol, Fatty Acids Group [F.A.G.: Palmitic Acid, Oleic Acid, Linoleic Acid, Stearic Acid, N-(2-Hydroxyethyl)Hexadecanamide]; Triethanolamine, Carbomer, Hydroxyethylcellulose, Linum Usitatissimum Seed Oil, Sodium Methylparaben, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethyl Linoleate, Sodium Hyaluronate, Disodium EDTA, D-Limonene, Sodium Saccharin, Olea Europaea Oil Unsaponifiables, Linalool, Triacetin, Lecithin, Chlorhexidine Digluconate, Citrus Limon Peel Oil, Ethyl Vanillin, Tocopherol, Citral, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil. Avvertenze Gli studi di biocompatibilità effettuati non hanno evidenziato controindicazioni o effetti indesiderati; tuttavia l'uso del prodotto è da evitarsi nei pazienti con una storia di ipersensibilità o di allergia accertata verso uno qualsiasi dei suoi componenti. Informare il medico o il farmacista sull'insorgenza di effetti indesiderati riconducibili al prodotto non descritti nel presente foglietto illustrativo. Non usare OraLife Gel su ulcere e/o ferite aperte o secernenti, ed in caso di ferita infetta. Interrompere l'uso in caso di irritazione o di effetti indesiderati e consultare il medico o il farmacista. Evitare il contatto con gli occhi; in caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Utilizzare negli adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservazione Conservare a temperatura ambiente (non oltre i 25 °C) in un luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore o luce solare diretta. Non conservare in frigorifero e non congelare il prodotto. Avere cura di richiudere il contenitore dopo ogni applicazione. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Validità post-apertura: 6 mesi. Formato 1 Dispenser da 30 ml Cod. OG003