

PEDIAPEG 400 G

Marchio: PEDIAC
Codice Min.: 971741754
Link: [clicca qui per acquistare](#)



PediaPEG polvere Descrizione Dispositivo Medico Classe IIa (Direttiva 93/42/CEE). Ad azione lassativa che, attraverso un'azione di tipo osmotico, regolarizza l'intestino in modo naturale. Non viene assorbito né fermenta nell'intestino, non irrita la mucosa e viene eliminato nelle feci in forma non modificata. PediaPEG è particolarmente indicato nella stitichezza cronica e nei casi di intestino occasionalmente irregolare. Grazie infatti alla sua affinità per l'acqua, PediaPEG ammorbidisce le feci facilitando l'evacuazione senza provocare crampi né dolore addominale, né condizioni di urgenza. La sua efficacia non si riduce nel tempo. Senza glutine e lattosio. Modalità d'uso Da 6 mesi a 2 anni (fino a 12 kg): 0,8 g di prodotto per kg di peso corporeo al giorno. Da 2 a 11 anni (da 12 kg a 20 kg): 1 g di prodotto per kg di peso corporeo al giorno. Al di sopra di 11 anni (o >20 kg): 10-30 g

di prodotto al giorno. La dose può essere aumentata o diminuita a seconda della risposta individuale al trattamento. La posologia giornaliera più corretta per fascia d'età è da decidere in base al peso del bambino e alla severità della stipsi. Si consiglia in ogni caso di sentire il parere del medico per la posologia più corretta. Utilizzare il prodotto nei bambini in età pediatrica solo dopo consiglio medico. La dose massima necessaria non supera normalmente i 30 g di prodotto al giorno. In base alla posologia prelevare il quantitativo di prodotto con l'ausilio del misurino dotato di tacche che permettono di dosare 0,5 g (prima tacca), 1 g (seconda tacca) e 2 g (misurino raso) di prodotto. Sciogliere un misurino raso (pari a 2 g) in circa 1/4 bicchiere d'acqua (circa 25 ml). Bere la soluzione così ricostituita. È possibile suddividere la dose giornaliera in più somministrazioni. Il prodotto può essere ricostituito in anticipo nel volume d'acqua appropriato e la soluzione conservata in frigorifero coperta fino ad un massimo di 24 ore. Si consiglia di assumere PediaPEG lontano dai pasti. Componenti 400 g di Macrogol 3350; eccipienti: biossido di silicio, aroma, saccarina sodica. Avvertenze Non assumere PediaPEG in caso di stenosi intestinale, perforazione intestinale, malattie infiammatorie dell'intestino (come esempio morbo di Crohn, colite ulcerosa). Non assumere in caso di ostruzione intestinale. La sospensione orale deve essere preparata al momento dell'assunzione. Si consiglia di non assumere quantitativi maggiori di quelli indicati, in quanto dosi più alte possono causare l'insorgenza di effetti collaterali inaspettati. Non utilizzare il prodotto per più di 30 giorni, se i sintomi persistono, consultare il medico. Non assumere in caso di intolleranza al prodotto. Non assumere in caso di ipersensibilità nota ai componenti ed al Polietilenglicole. Non utilizzare in bambini al di sotto dei 6 mesi. Durante il trattamento con PediaPEG è consigliabile seguire una dieta adeguata, accompagnata dalla somministrazione di una soluzione per la reidratazione orale (ORS) per evitare la disidratazione, si consiglia comunque di consultare il medico. In caso di sovradosaggio possono manifestarsi dolore intenso, distensione addominale, diarrea e vomito da cui potrebbe conseguire uno squilibrio elettrolitico. Qualora dovessero manifestarsi reazioni avverse,

rivolgersi immediatamente al proprio medico. Potrebbero apparire disturbi gastro-intestinali, borborigmi, dolori addominali, nausea e leggere diarree (soprattutto all'inizio). Raramente si manifestano reazioni di ipersensibilità e reazioni allergiche (rush cutaneo, orticaria). Consultare il medico o il farmacista qualora dovessero verificarsi reazioni avverse, anche diverse da quelle elencate. Nel caso si dimentichi l'assunzione non assumere una dose doppia, ma aspettare e assumere la dose successiva. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata. Conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto, a temperatura non superiore a 25°C. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Validità dopo la prima apertura: 1 mese. Formato Barattolo da 400 g.