

PEGINPOL 400 G

Marchio: STEVE JONES
Codice Min.: 981249220
Link: [clicca qui per acquistare](#)



PEGinpol Descrizione Dispositivo medico in polvere per sospensione orale estemporanea utile nel trattamento della stipsi. PEGinpol è particolarmente indicato nella stitichezza cronica e nei casi di intestino occasionalmente irregolare. PEGinpol è un dispositivo medico ad azione lassativa che, attraverso un'azione di tipo osmotico, regolarizza l'intestino in modo naturale. Grazie infatti alla sua affinità per l'acqua, PEGinpol ammorbidisce le feci facilitando l'evacuazione senza provocare crampi, né dolore addominale, né condizioni di urgenza. Non viene assorbito né fermenta nell'intestino, non irrita la mucosa e viene eliminato nelle feci in forma non modificata. La sua efficacia non si riduce nel tempo. Ingredienti Un flacone contiene: 400 g di Macrogol 3350. Eccipienti: biossido di silicio, aroma, saccarina sodica. Non contiene glutine e lattosio.

Modalità d'uso Da 6 mesi a 2 anni (fino a 12 kg): 0,8 g di prodotto per kg di peso corporeo al giorno. Da 2 a 11 anni (da 12 kg a 20 kg): 1 g di prodotto per kg di peso corporeo al giorno. Al di sopra di 11 anni (o >20 kg): 10-30 g di prodotto al giorno. La dose può essere aumentata o diminuita a seconda della risposta individuale al trattamento. La posologia giornaliera più corretta per fascia d'età è da decidere in base al peso del bambino e alla severità della stipsi. Si consiglia in ogni caso di sentire il parere del medico per la posologia più corretta. Utilizzare il prodotto in età pediatrica solo dopo consiglio medico. La dose massima necessaria non supera normalmente i 30 g di prodotto al giorno. In base alla posologia sopra indicata, prelevare il quantitativo di prodotto con l'ausilio del misurino dotato di tacche che permettono di dosare 0,5 g (prima tacca), 1 g (seconda tacca) e 2 g (misurino raso) di prodotto. Sciogliere un misurino raso (pari a 2 g) in circa 1/4 bicchiere d'acqua (circa 25 ml). Bere la soluzione così ricostituita. È possibile suddividere la dose giornaliera in più somministrazioni. Il prodotto può essere ricostituito in anticipo nel volume d'acqua appropriato e la soluzione conservata in frigorifero coperta fino ad un massimo di 24 ore. Si consiglia di assumere PEGinpol lontano dai pasti. **Avvertenze** La sospensione orale deve essere preparata al momento dell'assunzione. Si consiglia di non assumere quantitativi maggiori di quelli indicati, in quanto dosi più alte possono causare l'insorgenza di effetti collaterali inaspettati. Non utilizzare PEGinpol per più di 30 giorni consecutivi, se i sintomi persistono consultare il medico. Non assumere in caso di intolleranza al prodotto. Non assumere in caso di ipersensibilità nota ai componenti ed al Polietilenglicole. Non utilizzare in bambini al di sotto dei 6 mesi. Durante il trattamento con PEGinpol è consigliabile seguire una dieta adeguata accompagnata dalla somministrazione di una soluzione per la reidratazione orale (ORS) per evitare la disidratazione; si consiglia comunque di consultare il medico. Non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di mancata assunzione non assumere una dose doppia, ma aspettare e assumere

la dose successiva. In caso di reazioni avverse sospendere l'utilizzo del prodotto e rivolgersi immediatamente al proprio medico o farmacista. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura non superiore a 25°C, nella confezione originale. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Flacone da 400 g. Cod. 3078