


PEGINPOL MACROGOL 3350 SOSPENSIONE ORALE 100 G

Marchio: Steve Jones
Codice Min.: 971176286
Link: [clicca qui per acquistare](#)



buona PEGinpol Macrocol 3350 Polvere per sospensione orale Utile per il trattamento della stipsi Categoria di appartenenza Dispositivo medico appartenente alla classe 2A. Indicazioni PEGinpol è un dispositivo medico in polvere per sospensione orale estemporanea utile nel trattamento della stipsi. PEGinpol è particolarmente indicato nella stitichezza cronica e nei casi di intestino occasionalmente irregolare. Modalità d'uso Da 6 mesi a 2 anni (fino a 12 kg): 0,8 g di prodotto per kg di peso corporeo al giorno. Da 2 a 11 anni (da 12 kg a 20 kg): 1 g di prodotto per kg di peso corporeo al giorno. Al di sopra di 11 anni (o > 20 kg): 10-30 g di prodotto al giorno (5-15 misurini rasi). La dose può essere aumentata o diminuita a seconda della risposta individuale al

trattamento. La posologia giornaliera più corretta per fascia d'età è da decidere in base al peso del bambino e alla severità della stipsi. Si consiglia in ogni caso di sentire il parere del medico per la posologia più corretta. Utilizzare il prodotto in età pediatrica solo dopo consiglio medico. La dose massima necessaria non supera normalmente i 30 g di prodotto al giorno. In base alla posologia sopra indicata, prelevare il quantitativo di prodotto con l'ausilio del misurino dotato di tacche che permettono di dosare il prodotto. Sciogliere la polvere in acqua considerando, per ogni misurino raso (pari a 2 g) di polvere, circa 1/4 di bicchiere d'acqua (circa 25 ml). Bere la soluzione così ricostituita. È possibile suddividere la dose giornaliera in più somministrazioni. Si consiglia di assumere PEGinpol lontano dai pasti. Descrizione e caratteristiche PEGinpol è un dispositivo medico ad azione lassativa che, attraverso un meccanismo di tipo osmotico, regolarizza l'intestino in modo naturale. PEGinpol è particolarmente indicato nella stitichezza cronica e nei casi di intestino occasionalmente irregolare. Grazie infatti alla sua affinità per l'acqua, PEGinpol ammorbidisce le feci facilitando l'evacuazione senza provocare crampi, né dolore addominale, né condizioni di urgenza. La sua efficacia non si riduce nel tempo. Non viene assorbito né fermenta nell'intestino, non irrita la mucosa e viene eliminato nelle feci in forma non modificata. Avvertenze La sospensione orale deve essere preparata al momento dell'assunzione. Si consiglia di non assumere quantitativi maggiori di quelli indicati, in quanto dosi più alte possono causare l'insorgenza di effetti collaterali inaspettati. Per periodi di utilizzo superiori ai 30 giorni è raccomandabile interrompere il trattamento con PEGinpol per almeno 3-5 giorni. Non assumere in caso di intolleranza al prodotto. Non assumere in caso di ipersensibilità nota ai componenti ed al Polietilenglicole. Non utilizzare in bambini al di sotto dei 6 mesi. Durante il trattamento con PEGinpol è consigliabile seguire una dieta adeguata accompagnata dalla somministrazione di una soluzione per la reidratazione orale (ORS) per evitare la disidratazione; si consiglia comunque di consultare il medico. Conservare le istruzioni interne insieme al prodotto. Conservare in luogo fresco e asciutto, a

temperatura non superiore a 25°C, nella confezione originale. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. Non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di reazioni avverse sospendere l'utilizzo del prodotto e rivolgersi immediatamente al proprio medico o farmacista. In caso di mancata assunzione non assumere una dose doppia, ma aspettare e assumere la dose successiva. Allergeni Non contiene glutine e lattosio. Ingredienti 100 g Macrogol 3350, biossido di silicio, aroma, saccarina sodica. Formato 100 g Cod. 3053